

FRAGMENTA
DE
VIRIBUS
MEDICAMENTORUM
POSITIVIS,

SIVE IN SANO CORPORE HUMANO

OBSERVATIS.

A

SAMUELE HAHNEMANN, M.D.

&c. &c. &c.

EDIDIT

F. F. QUIN, M. D.

MEDICUS ORDINARIUS LEOPOLDI PRIMI REGIS BELGARUM,

&c.

LONDINI:

VENEUNT APUD S. HIGHLEY.

MDCCCXXXIV.

LONDON:
C. ROWORTH AND SONS, BELL YARD,
TEMPLE BAR.

SPECTATISSIMO VIRO

HENRICO HALFORD, M.D.

BARONETTO,

REGIS MEDICO,

COLLEGII REGALIS MEDICORUM

LONDINENSIS PRÆSIDI,

&c. &c. &c.

D.D.D.

FREDERICUS F. QUIN.

Opus magni et sapientis viri editurus, nemini melius quam tibi, vir amplissime, dedicare possum, qui solertiâ, doctrinâ, felicitate locum inter medicos principem et potentissimum obtines. Proprium eminentis ingenii

est, ut alienam sententiam, utcunque a suâ discrepet, et clementer audiat et patienter perpendat. Tantum ab humanitate tuâ peto, ab æquitate tuâ expecto. Neque me parum profecisse existimabo, si tuæ comitatis exemplo ostendero, ea inter veteris et recentioris scholæ discipulos officia intercedere, quæ homines nobilissimæ artis societate conjunctos deceant.

PRÆFATIO EDITORIS.

Priusquam hoc opus in publicum emisit Hahnemannus, vir et animo et ingenio præcellens, libros et dissertationes de re Medicâ et Chemicâ scribendo, et opera complura Britannorum, Gallorum, et Italorum, in linguam vernaculam transferendo, valde innotuit. Circa annum 1805 hunc librum primum in lucem edidit, quum aliquot per annos Virium Medicarum studio incubuisset. Ante omnia vires medicaminum proprias et effectus in corpore sano observandos credidit.

Dum Cullenii (1790) Materiam Medicam transferebat variæ miræque de vi Cinchonæ febrifuga explicationes animum impulerunt, ut vires hujus corticis in corpore sano scrutaretur. Vitam simplicem degens, integrâ valitudine, efficientiam multorum medicamentorum in semetipsum experiri constituit, semperque inter medicamentorum effectus et morbi symptomata concentum magnum invenit. Tunc etiam in clarissimâ luce egregiam illam conspexit legem—Quemlibet morbum dyna-

micum optime sanari ejusmodi medicamento, quod pro genuinâ suâ indole, i. e. efficientiâ primariâ, complexum symptomatum quam simillimum eoque ipso affectionem similem excitare valeat.

In hoc opusculo experimenta centies repetita et diligentius observata scribuntur, et quamquam hæc medica doctrina a more consueto multum discrepet et opinione communi abhorreat, tamen speramus medicos nostrates, semper veri investigandi cupidos, eam perpendere non recusaturos.

Quum experimenta recentiora interdum ostenderunt vires medicas diutius existere quam auctor arbitrabatur, utile visum est notulas adjicere quæ durationem veram traderent.

F. F. Q.

Londini, MDCCCXXXIV.

PRÆFATIO.

Quæ corpus mere nutriunt, *Alimenta,* quæ vero sanum hominis statum (vel parvâ quantitate ingestâ) in ægrotum—ideoque et ægrotum in sanum—mutare valent, *Medicamenta* appellantur.

Instrumentorum artis suæ habere notitiam quam maxime perfectam, primum artificis est officium, medici vero esse, nemo, proh dolor, putat. Quid enim medicamina *per se* efficiant, id est, quid in sano corpore mutent, perscrutari, ut inde pateat, quibus in universum morbis conveniant, nemo hucdum medicorum, quantum scio, curavit.

Vires Medicaminum, dum iis in morborum conflictu utimur, non quæ ipsæ per se sint apparent, sed morbi symptomatis transformatæ—phænomena mixtæ prorsus naturæ et complicatæ, quæ parempiricos reddunt medicos, dum iis nituntur, et parum ad artem veram exercendam conferunt. Has *relativas* nominare liceat vires.

Equidem vero satius duxi, medicamenta nulla ægroto corpori adhibere, nisi ea, quorum vires in sano corpore (*absolutas* vel *positivas* vocare libet)

perspectas antea haberem et, si modo licuit, perspectissimas et exploratas. Experimenta maximâ quidem ex parte in me ipso, partim vero et in aliis cepi, quos noveram sanissimos et a morbo aperto alienissimos.

Medicamenta simplicia vires edunt in corpus sanum sibi unumquodque proprias, non tamen omnes simul vel in unâ et constanti serie, aut cunctas in singulis hominibus, sed hodie forsan has, illas cras, hanc primam in Cajo, illam tertiam in Titio, ita tamen ut et Titio aliquando usu veniat, quod Cajus inde sensit heri.

Medicina quævis alias vires citius edit, alias serius, quæ ambæ sibi utcumque oppositæ sunt et dispares, immo e diametro oppositæ; illas vires *primarias* vel *primi ordinis* nuncupo, has *secundarias* vel *secundi ordinis*.

Habet enim in justâ dosi unaquæque medicina tempus sibi proprium et fere definitum agendi in corpus humanum, brevius, longius, quo transacto omnia a medicamine profecta symptomata una exspirant.

Quarum itaque medicinarum effectus pro naturâ ipsarum brevi decurrit spatio, horum vires primariæ intra paucas horas apparent, et disparent, post illas secundariæ apparent, et non minus cito disparent. Hora vero ipsissima, qua vis quælibet sese exserere soleat, constanter determinari

nequit, partim ob naturam hominis diversam, partim ob dosium differentiam.

Quod majusculis typis expressum est symptoma, crebrius observavi, rarius vero quod minoribus literis excusum est.

Uncinis ( ) inclusa dubitanter profero, utpote non nisi semel a me observata, nec in casu satis integro, claro. Interdum veracitas hominis non satis probata hos uncinos addidit, vel si homo ingenii paululum hebetis erat, vel dietæ aliqua vitia commiserat.

Medicamina aliquot observavi, quorum operationis curriculum duobus, tribus vel pluribus paroxysmis constat, ambas vires et primarias et secundarias complectentibus, illas quidem, ut in universum dixi, primo loco, has vero secundo loco procedentes.

Nonnunquam et tertii cujusdam ordinis vires observasse mihi visus sum.

Quæ *reliquias* nominavi symptomata, ea non occurrunt nisi, ubi enormis dosis enormes suscitavit tumultus, tumque diutius justo aliquæ, vel primæ classis vires vel secundariæ remanent, hæ vel illæ, ut fert cujuslibet hominis natura, vel in hanc morbositatem vel in illam potissimum prona.

Per mediocres vel parvas doses fere non nisi primi ordinis vires in conspectum veniunt, secundi

ordinis minus. Illas inprimis curavi utpote ad artem medicam exercendam maxime aptas et scitu dignissimas.

Quatenus observare mihi datum est, veritati litavi scrupulosissime, religiosissime. Utamur his qualibuscumque; nemo me melius novit, quam manca sint et tenuia.

Adjeci ad calcem cujuslibet medicaminis ea, quæ scriptores medicinæ de positivis medicamentorum viribus quasi aliud agendo adnotarunt.

H.

VIRES MEDICAMENTORUM.

ACONITUM NAPELLUS (L.)

(Succus herbæ totius in sole inspissatus.)

Vis 16 ut plurimum horas durat, in minimis dosibus 8 horis absolvitur.† (Per totum operationis hujus plantæ curriculum vires primi ordinis et subsequæ secundi ordinis paroxysmis brevibus repetunt, bis, ter, quater, antequam effectus totus exspiret.)

Frigiditas totius corporis.

Frigus totius corporis, cum fronte calidâ, auriculis calidis et calore interno sicco.

Rigiditas frigida totius corporis, oculis apertis horridis, rigidis, gena altera rubra, calida, altera frigida pallida, cum pupillis angustis, parum et lente dilatabilibus.

Horrescentia, metus frigoris. (Aliquando post tertiam horam observavi.)

5 Brachiorum frigus, stupor.

Vertigo, titubationis in cerebro hinc inde pendentis sensus.

† Experimenta recentia monstrant vires hujus remedii ad horas quadraginta octo retineri posse.—*Ed.*

Aviditas lucis. (An etiam Musices? sic mihi videbatur semel.)

Muscæ volitantes in visu.

Sensus adstrictorius in faucibus quasi ab austeris.

10 Sensus adstrictorius in ventriculo quasi ab austeris.

Sensus in linguæ radice, piperis modo titillans, cum salivæ allectione.

Punctus in faucibus quasi a setis e fructibus cynosbati. (Intra primam horam observatum.)

*Propensio in offensionem summa.**

*Propensio in terrorem summa.**

*(Intra primam horam observatum.)

15 Angor et morositas cum punctione in pectoris latere; tum pulsatio in scrobiculo; tum capitis dolor.

Pressorius.

Tremor, propensio in palpitationem cordis.

Intolerantia strepitûs maxima. (Intra primam horam observatum.)

Rixæ cum maniâ scurrili alternantes a horâ ad horam —fabulæ aniles, animus nimis hilaris.

20 Opprobriatio. (Etiam quartâ horâ observatum.)

Articulationum omnium (ligamentorum eorum?) instabilitas. (Etiam quartâ, sextâ horâ observatum.)

Veneris appetentia imminuta.

Genuum instabilitas; status, gressus vacillans.

Syncope.

25 Paralysis volatica ani, sedes involuntariæ.

Paralysis volatica vesicæ urinariæ, mictus involuntarius.

Paralysis volatica linguæ.

Asthenia in femoris capite inter eundum, sive impossibilitas incedendi ob dolorem innominabilem, intolerabilem, fere quasi a contritione, vehementiæ nunc majoris, nunc minoris, in femoris capite, post decubitum et somnum nata. (Post quintam horam observatum.)

Asthenia in cruribus et femoribus paralytica post sessum.

30 Memoria debilis. (Etiam intra quintam horam observatum.)

Mœror.

Timor ne vacillet.

Meticulositas, ne mali quid sibi accidat.

Angor inconsolabilis et ejulatus miserabilis, opprobriis plenus, ob mala et incommoda (parva). (Post quintam horam observatum.)

35 DE MORTE PRÆSENTANEA TIMOR ET QUERELÆ. (A secundâ ad duodecimam usque horam observatum.)

Angor moribundi. (In sextâ aliquando horâ etiam observatum.)

Decubitus.*

*Propensio in decubitum pertinax.**

*(Etiam intra secundam et quintam horam observatum.)

Somnolentia, somnus. (Etiam secundâ horâ observatum.)

40 Capitis dolor supra orbitam in maxillam superiorem tendens, lancinans, vomituriens, seu ejusmodi ut a vomitoriis oriri solet, quadantenus pressorius. (Post secundam horam observatum.)

Capitis dolor pressorio lancinans, vomituriens, supra orbitam in maxillam superiorem tendens.

Capitis dolor obnubilans quasi a crapulâ, in temporibus pressorius.

Capitis dolor, quasi oculi e capite casuri essent.*

Capitis dolor, quasi cerebrum foras exprimeretur.*

45 Capitis dolor, quasi cerebri pars modo hic, modo illic tollatur, motu parvo et loquelâ et potu excitandus, augendus.*

*(Intra semi-horam observatum.)

Capitis dolor lancinanti pulsatorius, ut ab ulcere interno, per accessus loqui impediens.

Capitis dolor hinc inde minutim pulsatorius.

Capitis dolor pulsatorius in fronte sinistro.

Capitis in fronte dextro ictibus fortibus per accessus. (Post tres horas observatum.)

50 Sensus crepitans in temporibus, naso, fronte. (Sensus soni quasi ab aurichalci laminis motitatis.)

Proctalgia. (Primâ horâ observatum.)

Lancinatio et pressio in ano.

*Dolor pressorius, qui gravitatem mentitur, in ventriculo.**

*Dolor pressorius, qui gravitatem mentitur, hypochondriis.**

*(Post sesquihoram observatum.)

55 *Dolor pressorio tensivus, quasi a pondere et plenitudine in ventriculo, hypochondriis.* (Post semi-horam observatum.)

DOLOR CONSTRICTORIUS IN PECTORE.

Dolor pressorio coarctans in pectoris latere.

Dolor pressorio tensivus in pectore, in sterno.

Dolor articulationis ossis sacri cum lumborum vertebris quasi a confractione.

60 Dolor vertebrarum lumborum tensivo pressorius, vel quasi a confractione, cum torminibus colicoflatuosis connexus.

Tormina colica, quasi a flatibus, pressorio tensiva.

Tormina flatuosa in imâ parte abdominis, quasi a purgantibus flatuosis.

Borborygmi fermentantes quasi.

Sedes molliores, parvæ, tenesmodæ. (Tres, quinque per diem; interdum inter reliquias observatum.)

65 Vomituriens nausea primo in scrobiculo, tum sub sterno, denique in faucibus sine salivæ concitatione.

Vomituriens nausea, quasi ab esu nauseosi, cujusdam vel pinguis, vel dulcis. (Horâ primâ observatum.)

Ructuum molimina frustranea.

Sapor fatuus, piscosus, quasi aquæ muçidæ, in putrescentiam inclinantis.

Anima fœtida.

70 *Sedes albæ.*

Excrementa alba, urina rubra.

Diarrhœa aquosa.

Dolor pressorius in regione hepatis, respirationem coarctans, postea statim tormina (forficantia?) in regione supra umbilicum.

Icterus.

75 Angor respirationem intercipiens, cum sudore frontis calido.

Asthma cum expiratione validâ, sonorâ.

Dolor in scrobiculo pressorius, in angustiam pectoris transiens. (Versus tertiam horam observatum.)

Scrobiculi dolor, quasi interne tumidum esset, cum anorexiâ et respiratione per accessus, brevi.

Respiratio per nares intercepta, maxime inter somnum.

80 Pavor concussorius, agitatio, blateratio in somno.

Dolor in dorso a nuchâ ad os sacrum usque, quasi a contusione. (Ante quartam horam observatum.)

Dolor rheumaticus in nuchâ, colli motu tantum percipiendus. (Etiam intra quintam et nonam horam observatum.)

Dolor in osse cubiti strictorio lancinans, motu excitandus.

Dolor in testiculo simplex, sive is qui post conquassationem remanet. (Secundâ horâ observatum.)

85 Lancinatio et forficatio in glande penis durante mictu.

Dolor vesicæ inter eundum.*

Tenesmus vesicæ colli.*

*(Quartâ etiam horâ observatum.)

Micturitio anxia. (Quartâ horâ observatum.)

Micturitio post tactum abdominis.

90 Hypogastrium post tactum dolorifice sensibile.

Inter eundum dolores in lumbis quasi ad partum, tumque,

Dolor lancinans in latere dextro et animus flebiliter querulus.

Ardor in umbilicali regione.

Ardor et punctus in pectore.

95 Ardor et punctus in faucibus.

Dolor formicans in digitis.

Dolor formicans in genis.

Dolor formicans in gulâ.

Dolor formicans in pectore.

100 Dolor formicans in pectore quasi a scarabæis reptantibus.

Dolor formicans in spinâ dorsi, quasi a scarabæis reptantibus.

Cutis formicatio, pruritus, desquamatio (maxime in parte pridem affectâ).

Tussicula.

Tussis sanguinea.

105 *Epistaxis.* (Intra quartam et nonam horam observatum.)

Catarrhi, coryzæ symptomata. (Etiam ab octavâ ad decimam sextam usque horam observatum.)

Hæmorrhois fluens.

Menorrhagia.

Ophthalmia valde dolorifica, chemosis.

110 Siccitas palpebrarum superiorum quasi pressoria. (Quintâ horâ observatum.)

Caloris sensus primo in manibus, dein in toto corpore, in pectore adeo, sine calore sensibili externo. (Quartâ horâ observatum.)

Paroxysmi alternantes: modo inter genarum ruborem scurrilitas, caloris sensus universalis et capitis dolor inter movendum oculos sursum et ad latus. (Tertiâ, quartâ, sextâ horâ observavi.)

Modo inter genarum ruborem et calorem capitis horripilatio per totum corpus, cum sapore integro.

Modo inter genarum ruborem reluctantia pertinax, ardor circa umbilicum et pressorius in capite dolor.

115 Sudor cum horrore febrili. (Post tertiam fere horam observatum.)

Sudor lenis universalis.

Volæ manus frigido humidæ.

(Œdema frontis, faciei).

Sensus quasi a convalescentiâ e morbo gravi. (Etiam post horam duodecimam observatum.)

120 Lucis odium. (Post duodecimam horam observatum.)

Somnus levior.

(Lac in nutricibus auctum).

Animus fortis, constans, nec hilaris. (Horis post octavam.)

Animus iræ capax.

125 Pertinacia.

Visus acutus.

Memoria viva.

Imaginatio viva.

Cogitationes altæ, meditatio alta.

130 Pupillæ dilatatæ.

Agrypnia. (Aliquando jam quartâ horâ observavi.)

Ardor in vesicæ collo extra mictum.

Maculæ puliceæ in manibus, facie, etc.*

Nausea diuturna, appetitus prostratus.*

135 Ductuum salivalium quasi excoriatio.*

Languor.*

Intestinorum debilitas, qualis a laxantium abusu evenire solet.*

Sudor languidus.*

* (Hæc symptomata nonnisi tamquam reliquias observavi, inter doses majores, post 15 et 16 horas.)

OBSERVATA ALIORUM.

CLAUD. RICHARD. ap. SCHENK, lib. VII. obs. 136.
(A drachmâ pulveris in adulto.)

Angustia pectoris.
Dolor stomachi.
Oculorum obtenebratio vertiginosa, pulsu immutato.
Mortis præsentaneæ metus.
[5] Cum anxietate vomitus.
Post vomitum statim spes erecta.
Dolor posterioris capitis partis et colli.
Delirium, ineptiæ.
Delirio evanido, dolores stomachi, capitis, maxillarum, pectoris, et modo unius, modo alterius juncturæ.
[10] Omnes juncturæ dolent. (Elapsis septem horis.)
Ventris tumor, quasi hydropicus esset.
Præcordia duro et doloroso tumore tensa.
Punctio in renibus, cum suppressione urinæ.
Brachium alterum et crus paralyticum.
[15] Pulsus febriculosus, sæpe interceptus.
Inter vomitum aliquoties repetitum et sedes, tamen querela perpetua quasi de lapide frigido in ventriculo.
Ophthalmia lippitudinosa, adeo dolorifica et horrida, ut mori potius cuperet. (Symptomata omnia conquievere horâ octavâ elapsâ.)

MATTHIOLUS, Comment. in DIOSC. lib. IV. cap. 73.
(In adulto.)

De universi corporis lassitudine, imbecillitate magnâ et cordis gravedine querelæ. (Post tres horas.)

Inter audacem loquelam et vividis oculis frons sudore frigido madida, et pulsus fere deletus. (Quæ sequuntur deleteria symptomata, omisi, utpote magis ab antidoto quodam ignoto, hic propinato, acerrimo, quam ab aconito profecta.)

IDEM, ibidem. (A drachmâ in adulto.)

A pipere quasi sapor.

Vomitus bilis viridis. (Post horam primam.)

[5] Sensus quasi a globo circa umbilicum, superna petente, inque vertice et occipite auram quandam frigidam diffundente.

Stupor paralysi similis in brachio et crure sinistro, ita ut vix manum summam movere possit.

Ex sinistro latere, brevi a paralysi liberato, paralysis subito in dextrum latus migrat.

Sensus, quasi venæ omnes frigescerent.

Vertigines.

[10] Dolor capitis ardens, quasi cerebrum ab aquâ bulliente commoveretur.

Oris convulsio.

Oculorum convulsio.

Maxillarum acutissimus dolor, quasi excidere vellent.

Oculi turgentes.

[15] Livida facies, labia nigra.

Ventris tumor, quasi hydropicus.

Vicissitudines mentis perturbationum contrariarum.

Modo de vitâ desperatio, modo spes erecta.

Modo rationis compos, modo delirans.

[20]. Modo ploranti similis, modo cantans.

Appetentia aquæ frigidæ.

Occœcatio reiterata, loquela integra.

Agon per vices repetens. (Post septimam horam symptomata evanida.)

VINCENT BACON, Philos. Transact. vol. xxxviii. No. 432, p. 287.

In linguâ et maxillis ardoris sensus et formicatio, ita ut dentes vacillare viderentur. (Statim post esum aconiti in acetario.)

Sensus quasi a tumore magno in genis.

Formicationis et ardoris sensus totum corpus sensim occupans, maxime brachia et crura.

Debilitas magna juncturarum, maxime genuum et malleolorum, cum vulsione in tendinibus, ita ut vix incedere posset.

[5] Sensus, quasi sanguinis cursus in extremitatibus interceptus esset.

Ab emesi artificiali symptomata pejora.

Vertigo.

Caligo in visu.

Oculi distorti.

[10] Aurium continuus surdus sonus et susurrus, lipothymia subsequa.

Capitis gravitas.

Virium defectus.

Nisus in decubitum.

Pulsus duo, tres, citi; asphyxia, idem tempus durante, subsequa.

[15] Quiete jacet, sed friget et horret et stragulis multis operiri gestit.

Calor lenis cum sudore modico.

Somnus tranquillus. (Horarum quatuor ad quinque.)

RODDER, in ALBERTI Jurisp. Med. tom. vi. p. 724. (Externe succus in vulnere.)

Dolores digiti et brachii.

Cardialgiæ.

Anxietates cum metu suffocationis.

Lipothymia.

[5] Calor magnus cum siti.

Tumor partis, et gangræna, suppuratione insigni subsequâ.

MORÆUS in K. Vet. Ac. Handl. 1739, p. 41.

Insania brevis.

Vomitus cum siti molestâ subsequâ.

Sapor fatalis. (Relictis post mortem maculis lividis circa collum, dorsum et hinc inde in reliquo corpore.)

ANTON STOERCK, lib. de Stram. Hyos. et Acon. Viennæ 1762, p. 71, 74, 80, 91, 96, 100.

In linguâ ardor diu inhærens.

Momentanei, vagi, lancinantes dolores in linguâ cum salivæ affluxu.

Mador et sudor corporis totius.

Pruritus in corpore, maxime circa pudenda.

Pustulæ rubicundæ, acri humore repletæ.

[5] Purgatio.

Leucorrhœa copiosa, tenax, flavescens.

Pustulæ latæ, rubræ, prurientes per totum corpus.

Lotii copiosius profluvium.

EBERH. GMELIN, Nov. Act. N. C. vol. vi. p. 394.

Prostratio virium insignis.

ACRIS TINCTURA.†

(Spiritus vini cum kali caustico digestus et, ne kali prævaleat, cum tincturâ acido aceti saturatâ.)

Vis ad 20 et 22 horas usque extenditur.

Angor maximus. (Plus quam duodecim horas durare vidi.)

(Vertigo).

Tremor.

Tremor manuum.

5 Rixæ. (Post quadrantem horæ ad sesquihoram usque observavi.)

Reluctantia.

*Dolores arthritici in omnibus membris.**

*Dolor arthriticus in maxillâ inferiori.**

* (Jam post semi-horam incipere vidi.)

(Dolor laceranti lancinans in aure cum sussurro quasi a vento procelloso).

10 Debilitas paralytica in artubus. (Horâ tertiâ observatum.)

Lapsus virium syncopticus.

Artuum convulsiones. (An potius vulsiones uno ictu concussoriæ fuerunt? ambigo.)

Pandiculationes. (Sextâ horâ observatum.)

Pedum frigiditas maxima.

15 *Oscitatio.*

Flatuum eruptio sursum, deorsum.

Febrile frigus per horam, tumque

Calor in fronte.

† Quid sit principium causticum, in calce vivâ et alcalibus causticis reperiundum, nondum liquet—*esse* tamen, nec a basi alcalicâ dependere, ex viribus medicatis vehementibus tincturæ acris (acido saturatæ) liquet.

Cephalalgia pulsatoria, pulsus arteriarum in cerebro vehementer dolorosi.

20 Sudor vehemens.

Pruritus in cute.

Eruptiones in cute.

Sapor escarum imminutus.

Pressio in scrobiculo.

25 Cardialgia.

(Raucedo).

Asthma convulsivum.

Dolor oculorum.

Alvus soluta.

30 Agrypnia. (Non satis mihi constat, an posteriorum symptomatum quædam inter reliquias sint referenda.)

ARNICA MONTANA L.

(Tinctura spirituosa pulveris radicis, Radicis pulvis.)

Vis durat ad minimum 12, plerumque 16 horas.†

Frigus, frigiditas universalis.

Frigus maxime vespertinum.

(Vertigo).

Palpitatio cordis maxima. (Post octavam partem horæ observatum.)

5 Tremor.

Capitis perturbatio.

Inquietudo.

Oculi horridi, anxietatis nuncii.

Angor agonizans.

10 (Inspiratio cita, gravis, exspiratio lenta).

Oscitatio vespertina crebra, sine dormituritione.

Oscitatio crebra.

Languor.

Dormituritio. (Post semi-horam observatum.)

15 Hypochondriaca morositas ad quævis segnis.

Adiaphoria erga negotia; indifferentia.

Tædet negotiorum, segnis ad negotia.

Anxietas hypochondriaca.

Spei abjectio.

20 Lacrymatio.

Morositas summa, taciturna.

Morositas primo varia appetens, deinde modo fastidiens.

Vomituritio inanis. (Post quadrantem horæ observatum.)

† Experimenta recentiora ostendunt vires hujus medicamenti ad dies sex retineri posse.—*Ed.*

Maxillæ inferioris paresis.

25 Appetentia aceti.

Appetentia aeris liberi.

Symptomata, maxime capitis perturbatio, angor, vertigo, augentur vomitu artificiali.

Dolor pressorius in velo palatino. (Anginæ species?)

Deglutitio strepera.

30 *Deglutitio nauseâ quâdam impedita, quasi escæ descendere detrectent.*

Plenitudinis saturo-nauseabundæ sensus in ventriculo.

Dentes mucaginosi. (Primâ horâ observatum.)

Ructus inanes.

Ructus amari, hepatico—sulphurei. (Post secundam horam observatum.)

35 Regurgitatio aquæ salsæ.

Sensus mordax in linguâ. (Etiam quartâ horâ observatum.)

Sensus quasi ab excoriatione linguæ. (Quartâ horâ aliquando observatum.)

Cardialgia forficans, convulsiva.

Dolor ventriculi, cardialgia.

40 Borborymi, flatus.

Flatulentia colicalis.

Colica.

Tormina quasi pressio a flatibus.

Tormina lacerantia supra umbilicum.

45 *Tormina dysenterica, in infimis ossium ilium recessibus ab utrâque parte fodientia, nauseabunda, soporifera.* (A secundâ ad quintam usque horam observatum.)

Nisus in diarrhœam irritus.

Tenesmus ani.

(Proctalgia pressoria).

Dejectiones parvæ, crebræ, mere mucosæ. (Aliquando intra sextam et septimam horam observatum.)

50 Egestiones diarrhoicæ, albæ.

(Diarrhœa fermenti fusci instar).

Excrementa indigesta, quamvis non fluida.

Tenesmus vesicæ urinariæ, micturitio irrita.

Lancinatus in urethrâ.

55 Pruritus seu punctus pruriens in glande penis.

Lancinatus singuli in scroto.

Fissuræ labiorum.

Labia sicca, siti torrida.

Sitis sine calore externo, pupillis parum dilatabilibus. (Primâ horâ observatum.)

60 Sensus corrugationis in palato, quasi ab austeris. (Horâ quintâ observatum.)

Ardor in faucibus cum caloris interni sensu, seu potius eo angore, quem calor excitare solet, sine calore externo.

Calor in capite, corpore cæteroquin frigido, saltem non calido.

Ardor, rubor in genâ alterutrâ, corpore cæteroquin frigido, saltem non calido.

Ardor in cerebro, corpore frigido, certe non calido.

65 Capitis cum ardore dolor pressorio distendens.

Dolor pressorius in fronte.

Post cephalalgiam pressoriam (etiam in temporibus) cephalalgia pulsatoria pressoria.

Post cephalalgiam, primâ horâ exactâ, frigus externum et internum et angor continuus.

Dolor in fronte punctorius, sublatione oculorum auctus, cum faciei calore et siti.

70 Dolor in capite quasi a clavo per tempora transfixo, cum sudore universali, languore subsequo. (Post aliquot horas, mediâ nocte.)

Dolor punctorio lacerans in temporibus (sinistris), identidem reiterans. (Quartâ horâ observatum.)

(Capitis dolor vulsorio lacerans, pronatione et tussi auctus).

Formicatio in vertice externe. (Post primam horam observatum.)

(Dolor pressorius in aure).

Susurrus aurium. (Non nisi inter reliquias observavi, sed primi ordinis esse vim puto.)

75 Narium exulcerationis sensus.

Dolor punctorio lacerans in naso.

Nasi tumor.

Glandularum tumores.

Dentium vacillatio, elongatio, non dolorosa.

80 (Odontalgia quasi a luxatis (vacillantibus) dentibus, pressorio pulsatoria, quasi a sanguinis turgore extra premerentur tactu tunc digitorum dolorosiores).

Dolor pressorius in pectore (dextro) parvo spatio circumscriptus, nec motu nec tactu, nec respiratione auctus.

(In pectore strictorius dolor, cum anxietate).

Sensus in pectore sinistro, medio, constrictorius, respirationem angustans, non dolorificus; scrobiculum tunc, si tangitur, dolore affectum, respirationem præcludente.

Dolor lancinans in pectore sinistro, medio.

85 Dolor in pectoris latere dextro punctorius.

Dolor punctorio lancinans sub costis ultimis.

Dolor lancinans in utrovis latere (pectoris); cum tussiculâ dolorem exasperante et asthmate continuo.

Sternutatio. (Ab interno usu.)

Tussis siccissima ob pruritum in infimâ bronchiorum sede. (Quartâ horâ observatum.)

90 *Tussis nocturna inter somnum.*

Hæmoptysis.

Tussis emesin creans. (Intra secundam et quartam horam observatum.)

Post vagitum tussis in infantibus.

Vociferatio tussifera infantum, cum morositate et jactatione. (Intra septimam et octavam horam observatum.)

95 Reluctatio pertinax. (Quartâ horâ observatum.)

Morositas imperiosa. (Post aliquot horas observavi.)

(Dolor lacerans in brachiis, manibus, et in occipite).

Dolor arthriticus in dorso, in artubus.

Sensus vulsorius in femore.

100 (Psoadis abscessus).

Dolor lacerans in artubus inferioribus.

Statio dolorosa.

Dolor quasi a distortione in carpo, in lumbis (in dorso, pectore).

Dolor pressorius in pede. (Qui tamen paralyticus erat.)

105 Formicatio, reptatio in pedibus.

Ictus singuli in pollice pedis.

Lancinatus in pede per pollicem.

Lassa artuum gravitas.

Dolor omnium articulationum inter movendum (fere paralyticus).

110 *Dolor omnium membrorum vibrans, dum corpus concutitur,* v. c. *in rhedâ vel dum pes sistitur.*

Hyperæsthesia dolorosa totius corporis.

Dolor ingratus, formicatio, pressio in parte pridem affectâ, contusa.

Ulcerum pus in ichorem, in serum mutat.

Inter somnum terrores, concussiones.

115 Excrementorum secessus involuntarius inter somnum. (Non vidi, nisi inter reliquias.)

Appetentia veneris summa. (In effœto observatum, inter vires secundi ordinis referri debere videtur.)

Pavor. (Non observavi, nisi inter reliquias.)

OBSERVATA ALIORUM.

De Meza, Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte, tom. xiii. 1.

Anxietates.
Angustia pectoris.
Abdominis dolores anxii.
Cephalalgia.
[5] Pulsus citus.
Nausea, vomituritio.
Calor totius corporis.
Cardialgia.

A. Crichton, Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte, tom. xiii. 3.

Sensus in cute punctorius.
Dolor ingratus in ventriculo.
Cardialgia.
Soda.
[5] Ictus quasi electrici in corpore.

Collin, Obs. circa Morbos, p. 5.

Anxietas.
Spasmus circa præcordia.
Concussio quasi electrica.
Ardor in epigastrio.
[5] Punctus in epigastrio.
Intropressio umbilici.
Sensus quasi a liquore in medullam spinalem vi injecto.
Dolores lacerantes in artubus.
Tremor.
[10] Formicatio, reptatio.

Lancinatus in oculis.
Ardor in oculis.
Ardentes et secantes hinc inde dolores.
Sudor.
[15] Mictio majoris urinæ copiæ, quam pota erat.
Vomitus.

VICAT, Mat. Med. i. s. 20 et 362.

Anxietates graves.
Sudor pectoris ruber.
Dolores lancinantes.

A. ASKOW, Soc. Med. Hafn. Collect. vol. ii. s. 162.

Vehementes vomituritiones.

ATROPA BELLADONNA L.

(Succus herbæ totius solis calore inspissatus.)

Vis per 58 horas ad minimum, per 72 horas ut plurimum durat.†

Frigiditas universalis, facie pallidâ.

Horror.

Memoria imminuta. (Non certo scio, an inter vires primi ordinis sit referendum.)

Stupor mentis.

5 Accessus vertiginis cum stupore mentis, aliquot minuta durans. (Circa decimam horam observatum.)

Obnubilatio capitis cum tumoribus glandularum in nuchâ. (Post sex horas observatum.)

Inebriatio.

(A cibo capto statim inebriatio).

Palpebræ diductæ, latius apertæ.

10 Pupillæ dilatatæ.

Diffidentia timida.

*Timiditas ploratoria.**

*Lachrymatio, ploratus, ejulatus, sine causâ, maximus, cum meticulositate.**

*(Semel post octavam partem horæ, crebrius intra octavam et duodecimam horam, etiam intra duodecimam et vigesimam horam, quamvis rarius observavi.)

† Aliquando Belladonna ad diem vigesimum primum et ultra vires retinet.—*Ed.*

Desipientia meticulosa timens de cane atro, de patibulo, etc.*

15 Desipientia, vivo corpore putrescere metuit.*

*Fuga motus, laboris.**

Abhorrescentia laboris, motus.*

*(Post primam horam, et circa quintam horam observatum.)

Rigiditas omnium artuum, sub specie lassitudinis sensus.

Paresis omnium musculorum, maxime pedum.

20 Paresis loquelæ organi.

Deglutitio impedita.

Impotentia deglutiendi non dolorosa.

Pulsus minimus, celer.

Tremor, cum concussione convulsivâ.

25 Gravitas crurum tremula. (Aliquando circa quartam horam observatum.)

Cibi appetitus nullus.

Potus appetitus nullus, adipsia.

Suppressio evacuationum alvi, urinæ. (Ad decem usque horas.)

Agrypnia.

30 Agrypnia ob angorem.

Angore impeditus somnus.

Dormituritio. (Semel vidi post semi-horam.)

Somnum capturi pavor concussorius.

Horror supra brachia et abdomen, non in capite. (Circa secundam horam observatum.)

35 Pedes frigidi, cum facie rubrâ, tumidâ, et congestione sanguinis ad caput.

Rubor et calor capitis solius.*

Sudor faciei solius.*

*(Aliquando circa primam horam observatum.)

Cum frigiditate externâ ardor internus.

Sudor manuum copiosus frigidus. (Circa quartam horam observatum.)

40 (Motu levi (eundo) excitatus calor corporis).

Singultus ructuosus, spasmus ex ructu et singultu compositus.

Propensio in ructus frustranea.

Ructuum molimina irrita.

Nisus vomendi irritus.

45 Nisus alvum exonerandi irritus.

Sapor nauseosus, lingua pura.

Sapor acidus panis.

Os mucaginosum inter experrectionem e somno; cum dolore capitis pressorio, brevi ambo evanida.

Post frustaneum alvum exonerandi molimen vomitus.

50 Tormina, cum intumescentiæ abdominis sensu, constrictoria umbilicum, per accessus invalescentia, quæ truncum incurvare et inclinare cogunt. (Circa quartam horam observatum.)

Dolores subiti, immanes, crampoides, breves, in alterutro latere pectoris, abdominis, immo lumborum, vel et cubiti, maxime in somno, partem dolorificam inclinare et incurvare cogentes. (Circa octavam, decimam sextam et trigesimam horam observatum.)

Tormini forficantia, trunco incurvato sedere cogentia, cum diarrhœæ moliminibus frustraneis, vomitu subsequente.

(Urina albida).

Dolores lancinantes in testiculo retracto. (Aliquando circa duodecimam, decimam octavam, et trigesimam horam observatum.)

55 Excrementa granulato citrina, aliquantum mucosa. (Mucosa prurulenta?)

Egestiones parvæ, celeres, involuntariæ.

Incontinentia urinæ.

(Calor pedum et manuum (vespertinus), nec tamen crurum aut brachiorum).

Pruritus pedum vehemens.

60 Formicatio a pedibus sursum. (Aliquando circa vigesimam horam observatum.)

Dolor fodiens in plantis pedum, et terebrans. (Serioribus horis observatum.)

Tumor pedum vespertinus.

Gravitas crurum strictoria.

(Intertrigo).

65 (Salivatio).

Excoriatio in buccis, ubi Stenonis ductus finit.

Dolor lacerans in fronte, externe.

Dolor lacerans in aure externâ et internâ versus inferiora.

Dolor lancinans in parotide.

70 Dolor in glandulis terrebrans.

Dolor capitis pressorius in alterutro hemicranio. (Aliquando circa quintam, aliquando circa vigesimam quartam horam observavi.)

Dolor capitis, quasi cerebrum foras exprimeretur, paulo supra orbitas in fronte, sublationem oculorum impediens, decumbere cogens, pupillas maxime contrahens dormituriens, vocem submittens.

Dolor immanis hinc illinc cerebrum lancinatibus obtusis, seu pressoriis permicans.

Joci futiles, scurrilitas. (Post minimam dosin circa sextam et octavam horam observatum.)

75 Dolor lancinans hinc inde sub cute in latera dextro, externe quadantenus.

(Pressorio lancinans dolor in latere sinistro infra costas).

(Strictorius in omnibus membris dolor).

Lacerans dolor modo hinc inde in dorso, modo in brachiis inter menstrua. (Lacerantes hi dolores cum

crampoidis illis, quos supra retuli, vel convenire, vel parum ab iis distare videntur.)

(Pressorius in pectore et intra scapulas dolor).

80 Catarrhus, seu tussis cum coryzâ.

Tussis valida inter somnum cum stridore dentium. (Circa horam decimam observatum.)

Extensio convulsiva artuum momentanea inter expergiscendum e somno.

Per horam capillorum casus copiosus; tum cessans.*

Capilli antea idiœlectrici, nunc minime.*

*(Circa horam vigesimam quartam observatum.)

85 Furunculus in humero.

Pustulæ parvæ in naso, in buccis, in nuchâ, in brachio erumpentes, cito purulentæ et crusta tectæ.

Laborium anguli et nares ulcerata non prurientia, nec dolorifica.

Erythemata et maculæ polymorphæ scarlatinosæ (prurientes?) (Circa horam decimam sextam observatum.)

Synocus erysipelacea, tumoribus inflammatoriis, immo gangrænosis stipata.

90 Menstrua. (An inter vires secundi ordinis sit referendum me latet.)

Pulsus magnus, plenus, rarus.

Furor atrox, lædens. (Trigesimâ horâ observatum.)

Pupilla contracta, ægre dilatibilis.

Appetitus auctus.

95 Sitis intensa.

Sudor magnus.

Sudor nocturnus, adustionem olens.

Sapor profundissimus.

Spasmus ventriculi in prandio chronicus.*

100 Anorexia chronica.*

Tubercula, tumores frigidi, dolorifici, chronici.*

*(Hæc tria inter reliquias observavi.)

OBSERVATA ALIORUM.

W. Th. Rau, Act. Nat. Cur. vol. x. obs. 24.
(A baccis in adulto.)

Sensuum privato. (Post duas horas.)
Calor vehemens.
Pulsus celer, inæqualis.
Stertor in bronchiis.
[5] Respiratio difficilis.
Spastici artuum motus.
Balbuties linguæ.
Faucium inflammatio.
Dementia aliquot septimanarum.

J. F. C. Glimm, Act. Nat. Cur. vol. ii. obs. 60.
(A baccis in trimulâ.)

Aversatio ciborum.
Sitis anxia.
Captatio somni frustranea.
Vomitus ciborum indigestorum, ante duodecim horas manducatorum.
[5] Convulsiones enormes, epilepsiam mentientes.
Insania.
Respiratio violenta, parva, crebra, anxia. (Post octodecim horas.)
Pulsus celerrimus, debilissimus, fere tremens.
Siti ardente et æstu excruciata potum modo desiderat, modo repellit exhibitum.
[10] Capilli madore rigent.
Vultus rubet tumens, reliquo corpore pallido.
Oculi scintillantes, torvi.
Corporis sudantis agitatio.

Mictus frequens urinæ pallidæ, tenuis, aquosæ, copiosæ.

[15] Garrulitas incongruorum, mente vehementer perturbata.

Cachinnus.

Convulsiones repetitæ, spasmi dirissimi, in primis flectentium musculorum.

Intermissio inter convulsiones, clamoris altissimi plena dolorum proditoris.

J. G. Hasenest, Act. Nat. Cur. vol. iii.
(A baccis.)

Soporosus affectus.

Amentia.

Pulsus debilis, tardus.

Mutitas.

[5] Cœcitas.

Gestus ridiculi, corpus obviorum palpat; nunc sedet, nunc circuit, caligans, jam lotricis, jam pecuniam numerantis, jam vero bibentis speciem præ se ferens.

Trismus.

Quasi somnolenta murmurat.

Æstus internus, ardor circa ventriculum.

[10] Amaurosis, typis excusa legere non potest. (Ultra tres dies durans.)

May, Hannov. Mag. 1773, No. 97.
(Baccæ in infantibus.)

Inebriatio. (Post semi-horam.)

Delirium.

Sitis molestissima.

Nisus vomendi irritus.

[5] Furor cum stridore dentium et convulsionibus.

Pupillæ diductæ, immobiles.

Facies rubra, tumida.
Trismus.
Deglutitio labefactata.
[10] Ventriculi irritabilitas deleta.
Sopor profundissimus cum tendinum subsultu, facie pallidâ et frigidâ, manibus frigidis, et pulsu duro, parvo, celeri.

MAPPI, Plant. Alsat. s. 56.

Gangrena universalis.

MARDORF, Diss. de Maniacis Giesensibus, Giesæ, 1691. (A baccis.)

Subitaneæ phlogoses.
Somnolentia turbulenta.
Titubatio.
Oscitatio ebriorum more.
Suspiria in tripudium soluta.
[5] Furor capillos adstantium diripientis.

J. J. WAGNER, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 10, Obs. 108. (A baccis.)

Virium lapsus.
Anxietas magna circa præcordia.
Cardialgia.
Stupiditas.
[5] Aphonia.
Tormina ventris.
Cruciatus diri circa præcordia.
Stupor.
Convulsiones epilepticæ.
[10] Apoplecticus status.
Hæmorrhagia oris, et narium.
Lethargicus, apoplecticus status, ultra nychthemerum, sine ullo membrorum motu vellicatus, oculos quidem aperiebat, sed vocem nullam edebat.

J. C. Hoyer, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 7 & 8, Obs. 176. (A baccis.)

Delirium cum ferociâ.

Vigilia aliquot dierum.

J. F. Dillenius, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 7, 8, Obs. 161. (A baccis.)

Profundus somnus.

Insania, abjectis vestibus, indusio solo velati in plateas excurrunt gesticulando, tripudiando, cachinnando, et delira multa tam blanterando, quam agendo.

J. J. Mayer, Commerc. Lit. Nor. 1731. (A baccis.)

Caput obtenebratum et inebriatio quasi a vino nimio, cum tumore et rubore faciei.

Calor summus universalis cum delirio.

Spuma sanguinolenta ante os. (Inter mortem.)

Boucher, Journ. de Med. vol. xxii. 1766, s. 310. (A baccis.)

Inquietudo.

Delira blateratio.

Agitatio continua totius corporis.

Spasmi continui oculorum, manuum.

[5] Oculi splendidi, pupillis summe dilatatis. (Circiter post viginti horas.)

Vultus inquietus.

Motus continuus corporis, maxime brachiorum, pulsu integro.

Abdomen tumidum, nec tamen durum, nec dolorosum.

Animus abjectus, demissus.

[10] Vultus conturbatus.

Pulsus exilis, debilis.

Motitatio valida hinc illinc, in lecto.

Mictus involuntarius.

Pupillæ maxime dilatatæ.

[15] Oculorum bulbi in gyrum spastice moti.

Brachiorum et manuum continua intorsio.

Brachia et manus interdum protensa, quasi aliquid captatura.

Mictus involuntarius.

Sopor cum pulsu exili, debili, inæquali. (Circiter post triginta horas.)

[20] Mictus involuntarius.

SAUTER, HUFELAND'S Journ. d. pr. tom. ix. 1, s. 122. (A rad. granis octo.)

Siccitas oris cum siti.

Brachii pridem læsi livor, lancinatus, dolor tensivus. (Post tres horas.)

Faciei tumor intense ruber.

Cutis in facie crassa, quasi exanthema erupturum sit.

[5] Totius corporis pruritus, eruptio stigmatum et macularum rubrarum. (Post quatuor horas.)

Pupillæ dilatatio.

Visus objectorum multiplex, scotomicus.

Pulsus plenus, fortis. (Post duodecim horas.)

Enuresis.

[10] Mania ferox.

Vultus atrox, musculi voluntarie et involuntarie ad furorem concitati.

In fugam nisus.

Dilacerat obvia, mordet, screat.

Modo violenter captat obvia, modo timide se retrahit.

[15] Sudor.

SAUTER, in Hufel. Journ. d. pr. Arzn. tom. xi. 1. s. 125.

Sitis aucta.

Mentis alienatio.

Suffocatoria deglutitio potus.

Continuus omnium musculorum motus.

[5] Tumor colli, pectoris.

Oculi agitati, rubri, splendidi.

Pupillæ dilatatæ. (Post tres horas cum semisse.)

Pulsus plenior, mollior.

Maculæ rubræ in facie, collo, pectore (toto corpore).

[10] Sudor universalis. (Post 6½ horas.)

ELLAS CAMERARIUS, in Obs. et apud WEPFER, Hist. Cicutæ. (A baccis.)

Sitis immanis aquæ frigidæ. (Post circiter quatuor horas.)

Deglutitio aquæ difficillima et non nisi in minimâ quantitate.

Blateratio inconcinna. (Post circiter sex horas.)

Crampus, spasmus ventriculi.

[5] Vomitus et statim somnus altus plurium horarum. (Post circiter septem horas.)

Expergefactio cum amaurosi.

Delirium.

Pulsus celer, debilis. (Post circiter novem horas.)

Abdomen circa costas tensum.

[10] Oculi cœci continuo aperti.

Cutis calore ardens.

Corpus modo immobile, modo artus motibus miris flexi.

Modo delirat, modo juste respondet et queritur.

Modo respirat, modo ultimum halitum expirasse videtur, vicibus per quadrantem horæ quater alternantibus.

SAUVAGES, Nosol. tom. ii. p. ii. s. 338. Febris.

Inflammatio superficiei corporis.

Aphonia temporaria.

Delirium jucundum.

Sopor.

WEINMAN, in GMELIN Giftpst. s. 296.

Tremor linguæ.

Risus sardonicus.

LOTTINGER, in Med. Chir. Vahrnehmungen Altenb. tom. ii. s. 326.

Siccitas oris, quasi cutis faucium a materiâ mordicante et acri degluberetur.

Atonia paralytica oris partium.

Vacillatio.

Urinæ epischesis guttatim prostillantis.

[5] Presbyopia.

Sapor deletus.

Anorexia.

DUMOULIN, in Med. Chir. Vahrnehmungen, tom. ii. 79.

Convulsivi motus extremitatum mites.

Vultus torvus.

Cachinnus.

Lacrimæ.

[5] Verba atrocia, semiarticulata.

Dilacerandi obvia nisus.

Mordendi adstantes nisus.

Paralysis sphincteris ani, alvi exoneratio involuntaria.

Paralysis sphyncteris vesicæ urinariæ, mictio involuntaria.

[10] Paralysis extremitatum inferiorum.

Med. Chir. Vahrnehm. tom. vii. s. 65.

Delirium.

Cachinnus.

Cantus.

Reminiscentia factorum ante triennium gestorum.

De St. Martin, Journ. de Medic. tom. xviii.

Risus sardonicus.

Circuitio, circumactio in gyrum.

Convulsiones, contortiones omnium musculorum.

Causus. (Post duodecim horas.)

[5] Pulsus minimus intermittens.

Sicelius, Diatribe de Bellad. Jen. 1724.

Inebriatio.

Pituita tenax oris.

Dormituritio.

Deglutitio.

De Meza, Samml. f. pr. Aerzte, tom. xiv. st. 3.

Siccitas oris vix delenda.

Vomitus pituitoso biliosus.

R. Buchave, ibid. st. 4.

Siccitas in ore, faucibus, naso per quatuor horas.

Indeglutitio ob siccitatem oris, faucium, nasi.

Balbuties ebrii instar.

Micturitio indesinens.

[5] Pulsus plenus, celer.

Congestio sanguinis ad caput.

Genarum rubor.

Vertigo.

Stupor mentis.

[10] Scolomia a pupillarum dilatatione.

Genarum tumor et rubor.

Faciei tumor magnus cum calore.

Totius corporis tumor cum rubore.
Loquacitas quasi a delirio, cum oculis fixis et horridis.
[15] Post loquacitatem mutitas.
Mentis absentia.
Inter somnum sudor.
Oculi retorti inter faciei tumorem et ruborem.
Exanthema morbillosum.
[20] Amentia cum artuum convulsivis motibus.
Rubor totius corporis, cum pulsu celeri.
Rubor et calor magnus genarum.
Loquacitas delirans.
Post somnum morositas summa, mordet adstantes.

J. B. PORTA, Mag. Nat. lib. VIII. 1.

Jacuit quatriduo sine cibo et motu, mortui instar.

DE LAUNAY d'HERMONT, Hist. de l'Acad. des Sc. 1756.

Respiratio difficillima.
Deglutitio abolita.
Urina suppressa.
Febris ardens, causus.
[5] Inebriatio.
Tremor.

HORST, Op. Omn. ii. s. 488.

Urinæ fluxus nimius.
Tumor capitis.
Delirium continuum.
Tremor.

TIB. LAMBERGEN, Lectio Inaug. Sist. Ephem. Persanati Carcinomatis. Groning. 1754.

(A foliis.)

Vertigo titubans.
Siccitas oris.

Angor.
Cardialgia.
[5] Presbyopia, non nisi literas majores legere potuit.
Tumor (sine rubore) faciei, maxime labiorum.
Labii ulcus, ruptum.
Bullæ aqueæ in volâ et in tibiâ ad rupturam pronæ.
Bullæ aqueæ serum affatim fundentes, maxime dolorosæ, ejulatum exprimentes.
[10] Dolor capitis vehemens.
Menstruum auctum.
Anorexia totalis.
Dolor crurum immanis, pedem extendere cogens.
Digiti inflammatio dolorosæ bulla obsessi.
[15] Bullæ serosæ dolorificæ in sterno.

VIERUS, De Præstigiis Dæmon. lib. III. cap. 17.
(A baccis.)

Furor.
Inagnitio parentum.
Animi languor.
Corporis languor.
[5] Somnus profundus 24 horarum.
Stupor mentis.

SAUTER in HUFELAND's Journ. d. pr. Arzn. tom. xi. st. 3, 8, 126.

Vesana patrat, tunicam dilacerat; lapides e terrâ eruit, quibus obvios feriat. (Post duas horas.)
In aquam se præcipitem dat.
Mania ferox. (Post decem horas.)
Facies profunde rubra.
[5] Pulsus plenus, magnus.
Corpus totum tumidum, ardens, rubrum.
Blaterario velox rerum insanarum.
Lacerat indusia et vestimenta.

Accessus symptomatum: inquietudinis, spasmorum, delirii reiterant circa septimam horam vespertinam.

GRUEDING in LUDWIGII Advers. Med. Prac. i. p. 4.

Somnus tranquillus.
Oculi inflammati.
Ardor in oculis.
Pressio in oculo quasi ab arenulis.
[5] Enuresis.
Sedes virides.

SCHRECK, Commerc. Lit Nor. 1743.

Tormina.
Furor.
Spasmi oculorum.

SCHMUCKER, Chirurg. Wahrnehm. ii.

Anxietas.
Oppressio pectoris.

LENTIN, Beobacht. p. 81.

Ulcera interna.
Febris post quamlibet dosin.

GOKEL, Franck. Samml. III.

Inflammatio faucium.
Inflammatio ventriculi.
Inflammatio duodeni initii.
Abdomen tumidum.

MANETTI, Viridar. Flor. 1751.

Spasmus ventriculi.
Deglutitio abolita.

Albrect, Commerc. Lit. Nor. 1731.

Ardor in abdomine.
Delirium, accessibus reiterans.
Inebriatio.

Valentini, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 10, obs. 118.

Delirium accessibus reiterans.
Furor.
Sopor.

Carl, Act. Nat. Cur. vol. iv. obs. 86.

Cachinnus immanis.
Ardor internus.
Debilitas magna.

Buchholz, in Hufel. Journ. d. pr. Arzn. tom. v. 1, s. 252.

In visu nebulæ ante oculos.
Sensus in cerebro quasi ab aquâ fluctuante.
Literæ aureo et azureo colore tremulantes.

Moibanus, ap. Schenck, lib. vii. obs. 164.

Conturbatio mentis ita ut, utrum dormiat, an vigilet, nesciat.

Perturbatio sensuum, in somnum propensi, ut, quodammodo vigilans, somniare sibi videatur.

Oculis insectorum variæ imagines, et lemurum quædam ludibria observantur.

In libris lecturus, præter candidam marginem, nigris areis literarum circumfusam, nihil agnoscere potest.

Vicat, Plant. Venen. de la Suisse, s. 181.

Deglutitio difficilis et dolorosa.
Sapor salivæ incongruus.
Raucedo.

Aurium susurrus.
[5] Insensibilitas.
Asthma.
Calor ardens externus vel internus.
Delirium vel per intervalla radians vel continuum, hilare primum, postea plerumque in furorem mutatum.

BUCHOZ, apud VICAT, pl. Ven. de la Suisse, s. 183.

Ebrietas.
Delirium.
Præcipitatio ab alto.

EHRHARDT, Giftpflanzen, x.

Rigiditas totius corporis.

CULLEN, Arzneimittellehre, ii. s. 307.

Siccitas insignis faucium.
Œsophagi constrictio insignis.
Hæmorrhagia faucium fatalis.

V. VASSERBERG, in Stoll's Ratio Medendi, p. iii. p. 403.

Siccitas in ore, œsophagi, naribus, oculis.

EVERS, in SCHMUCKER's Verm. Schr. b. i. p. 185.

Sudor magnus.
Enuresis.
Menstruatio.

EBERH. GMELIN, Acta Nat. Cur. vol. vi. App. (A baccis in viro.)

Inquietudo.
Anxietas.
Delirium.

Floccos carpit, evellit.
[5] Horror. (Spiritu vini poto.)
Oscitatio crebra.
De morte instante timor.
Tremor.
Vertigo.
[10] E lecto exsilire tentat. (Post opii electuarium sumtum.)
Inquietudo, anxietas.
Delirium.
Straguli tectum projicit.
Convulsiones.
[15] Sensibus orbus.
Suspiria. (Mors post quatuordecim horas.)

LAURUS CAMPHORA L.

(Camphoræ pulvis et solutio in Spiritu Vini.)

Vis duodecim circiter, ad summum sedecim vel viginti quatuor horas durat.†

Pupillæ contractæ.

Frigiditas universalis maxima.

Pallor faciei.

Hyperæsthesia frigidi aeris.

5 Oculi horridi fixi.

Horrescentia, horror cum cute anserinâ, cute dolorifice sensibili.

Adiaphoria.

Sensus aboliti. (Paucis post ingestam camphoram minutis observavi.)

Mentis impotentia.

10 Trismus.

Caput obstipum et oblique, humerum versus revulsum. (Paucis post ingestam camphoram minutis observavi.)

Bulbi oculorum sursum versi.

Respiratio alta, lenta.

Respiratio fere deleta.

15 *Akinesia.**

Spuma ante os.*

*(Paucis post ingestam camphoram minutis observavi.)

Dyskynesia et lassitudo crurum.

Pulsus parvus, durus, lentior, lentiorque.

Fragor juncturarum, lumborum, genuum, pedum.

20 Palpitatio cordis.

† Recentiora experimenta ostendunt hoc remedium raro durare ultra $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{4}$ partem horæ.—*Ed.*

Angor.

Tremor pedum.

Sudor frigidus.

Pedum instabilitas tremula.

25 Brachiorum aliquæ convulsivæ rotationes.

Dormituritio.

Omnia objecta externa odio sunt et morositatem aversantem causant.

(Ejulatus lacrymatorius in loco abdito, dicta aliorum tamquam imperata ægre ferens; animus injuriâ et conviciis lacessiri se putantis).

Contentiositas. (Secundâ horâ observatum.)

30 Asthma suffocatorium, pressione quâdam a scrobiculo, epigastrico proficiscens. (Primâ horâ observatum.)

Erysipelas. (Externo usui adhibita camphora.)

Dormiturientis et oculos claudentis is phantasiæ lusus, quo omnia objecta modo justo crassiora et grandiora, modo momento post, graciliora justo esse videntur, secundum velocitatem pulsus reiterans. (Secundâ horâ observatum.)

Dolor ventriculi.

Dolor pressorius in scrobiculo, vel in hepatis anteriori parte.

35 Dolor constrictorius circa hypochondria ad vertebras lumbares usque.

Cephalalgia pressorio lacerans.

Cephalalgia pulsatoria.

Cephalalgia quasi a contusione, a contritione, a vulnere.

Constrictionis in basi cerebri, maxime occipite et supra nasi radicem dolor indesinens, pedes frigidi manusque, frons calida, come vigil, capite in alterutrum latus acclinato, cephalalgia pronatione magna, decubitu et pressione externâ perquam auctâ.

40 Calor in capite et sensus in eo, quasi a sudore erupturo,

cum horrore artuum et abdominis. (Tertiâ horâ observatum.)

Lancinatus singuli vehementes in dextro hemicranio.*

Lancinatus singuli vehemente in velo palatino.*

*(Quartâ horâ observatum.)

Dolor in canto narium anteriori lancinans quasi ab exulceratione. (Secundâ horâ observatum.)

Dentes quasi elongati, odonti, odontalgia quasi cum glandulis submaxillaribus correspondens.

45 Dolor periostei omnium ossium.

Dolor rheumatico lancinans in omnibus musculis, maxime intra scapulas.

Sensatio quasi objecta solito lucidiora et nimis lucida essent. (Horâ circiter quintâ observatum.)

Pupillæ dilatabiliores et magis dilatatæ. (Horâ quintâ observatum.)

Consilii præcipitatio.

50 *Rubor genarum, auricularum.*

Congestiones sanguinis ad caput. (Aliquando horâ sextâ observatum.)

Calor capitis, manuum, pedum, sine siti.

Cephalalgia obtusa supra os frontale, vomituritiva.

Cephalalgia quasi a constrictione cerebri.

55 Coma et cephalalgia constrictoria aucta, calor totius corporis magnus, venæ tumidæ, respiratio citissima, sitis nulla, sapor integer, dorsi dolor quasi a contritione. (Post quatuor horas.)

Pulsus plenus, celer.

Sudor calidus frontis et volæ manus.

Sudor universalis calidus.

Bronchiorum et arteriæ asperæ dolor, inter tussiendum maxime, immo et inter screatum.

60 Stertor in somno in exspiratione et inspiratione.

Mictio dolorosa.

Ardor urinæ.

Urina rubra.

Ischuria, tenesmus vesicæ.

65 Radius exilis urinæ.

Mictio involuntaria post urgentem nisum migendi.

Ructus, eructatio contentorum ventriculi.

Flatulentia.

Alvi constipatio.

70 Ophthalmiæ.*

Gravedo.*

Coryza.*

Dentium vacillatio dolorosa.*

*(Hæc post horam decimam ut reliquias observavi; ad secundi certe ordinis vires referenda videntur.)

OBSERVATA ALIORUM.

Cullen, Arzneimittell. ii. p. 333.

(A 40 granis.)

Pectus concutit et animo delinquitur. (Post semihoram.)

Insensibilitas.

Pulsus perquam debilis, vix perceptibilis.

Respiratio fere evanida.

[5] Pallor, frigiditas totius corporis.

Somnus cum pulsu et respiratione auctis. (Post tres horas.)

Pulsus lentior. (Decem ictibus.)

Heberden, Med. Transact. vol. i. p. 4, 71.

(A scrupulis duobus in clysmate.)

Dolores quasi ad partum insignes.

(Ab usu interno.)

Stranguria. (Paulo post captum bolum camphoratum.)

WHYTT'S Works, p. 646.

(A semi-drachmâ.)

Ardor ventriculi.

Oculorum caligo.

Congestio sanguinis ad caput insignis.

GRIFFIN, Dis. de Camphoræ Viribus. Edinb.

(A semi-drachmâ.)

Nausea.

Vomitus biliosus sanguine tinctus.

Pulsus sensim celerior.

(A scrupulis duobus.)

Ardor ventriculi.

[5] Pulsus pluribus ictibus lentior.

Oscitatio et somnus. (Post tres horas.)

Vertigo per intervalla rediens.

Ebrietas.

Horror levis.

[10] Pallor vultus.

ALEXANDER'S Experim. Essays, p. 227.

(A scrupulo uno.)

Pulsus tribus ictibus imminutus.

(A scrupulis duobus.) (In semet ipso observata.)

In ore calor ingratus.

Pulsus decem ictibus imminutus.

Insignis virium lapsus cum oscitatione et pandiculatione.

[5] Vertigo.

Nausea.

Memoriæ defectus.

Sensuum abolitio.

Furor cum ore spumante.

[10] Convulsiones.

Tremor.

Sopor.
Pulsus acceleratus. (Ictibus viginti tribus post tres horas.)
Tinnitus aurium.
[15] Calor cum tremore.
Alvi obstructio pertinax.

COLLIN, Observ. circa Morbos, p. iii. p. 148.

Ebrietas.
Vertigo.
Spasmi.

LOSS, Observ. Med. p. 314.

Impotentia virilis.

KOHLHAAS, in Med. Nat. Zeit. 1799.

Œstrus venereus. (In viduâ.)

BREYNIUS et PAULINUS apud MURRAY, Appar. Med. iv. p. 518.

Veneris stimulus auctus.

SPONITZER, in HUFELAND's Journ. d. Pr. Arzn. v. p. 518, 545. (Ab odoratu.)

Tremor universalis.

(Ab externâ applicatione.)

Pruritus.
Erysipelas partis.

HUFELAND, Journ. d. pr. Arzn. i. p. 428, 433.

Agitatio anxia cum fletu continuo.
Pulsus plenus, irritatus.
Capitis dolor.
Pulsus decem ictibus lentior.
[5] Vomituritiones.
Delirium.

Vertigines volaticæ.

Pulsus celerior vel sine caloris augmento. (Decem, immo quindecim ictibus—post plures dies.)

FR. HOFFMANN, Consult. et Resp. Med. sect. i. cas. 19. (A scrupulis duobus.)

Angor maximus.
Sudor capitis frigidus.
Coma cum delirio.
Pulsus debilis, parvus.
[5] Calor magnus. (Post aliquot tempus.)
Pulsus celer.
Urina rubra.

GEOFFROY, Matière Med. iv. p. 30. (A nimiâ dosi.)

Gravitas capitis.
Vigiliæ.
Dispositio ad inflammationes.

QUARIN, Method. Febr. p. 57. (A majori dosi.)

Pulsus celerrimus.
Facies ruberrima.
Oculi torvi, inflammati.
Convulsiones.
[5] Phrenitis lethalis.

MURRAY, Appar. Med. iv. p. 484.

Sensus caloris in ore et ventriculo.
Acceleratio pulsus.
Congestio insignis ad caput.
Sudor. (Camphoræ odore.)

LYTTA VESICATORIA L.

(Pulveris Tinctura.)

Vis.†

Micturitio.
Lotium guttatim destillans.
Dolor pressorio lancinans in vesicæ collo.
Formicatio et pruritus in urethrâ post mictum.
5 Dolor mordax in urethrâ inter mictum.
Dolor strictorius in artubus, fere paralyticus.
Dolor in affectâ parte (v. c. ulcere) lacerans.
Dolor lacerans in dorso.
Effluvium auctum ex affectâ parte (v. c. ex ulcere pedum, e naribus in coryzâ chronicâ, ex urethrâ in blennorrhœâ chronicâ).
10 Muci in coryzâ chronicâ in sanguineum mutatio.
Sensus mordax in oculis, quasi a sale culinari insperso.
Inappetentia ciborum.
Debilitas, prostratio virium.
Morositas.
15 Diarrhœa sine torminibus.
Tormina.
Incarceratio flatuum in hypochondriis.
Agrypnia.
Pruritus in cute.
20 Sudor lenis nocturnus.

† Vires hujus remedii durant ultra dies quatuordecim.—*Ed.*

OBSERVATA ALIORUM.

BRASSAVOLA, apud SCHENCK, lib. vii. obs. 123.
(Ab interno usu.)

Canalis intestinalis ab ore ad anum usque excoriatio.
Vesicæ urinariæ excoriatio longa.

LANGE, apud SCHENCK, lib. vii. obs. 124, 127.

Sanguinis mictus copiosus.
Pruritus circa pudenda..
Punctiones in corporis cute.
Sapor picis cedrini in ore.
Mens parum constans.
Animi deliquium.
Vertigo.
Cruentum urinæ stillicidium.
Ardor urinæ continuus.

PASCHALIUS et OCCO, apud eundem, ibid. obs. 125. (Ab usu externo.)

Sanguinis mictus.

PAREUS, apud eundem, ibid. obs. 127.
(Ab usu interno.)

Sanguinis meri excretio per anum.
Sanguinis mictus.
Priapismus.
Ardor urinæ.

(Ab emplastro cantharidum in facie.)

Ardor vesicæ.

Cervícis uteri tumor.
Tormina.
Vomitus assiduus.
Mictus continuus.
[10] Dejectio virium.
Artuum jactatio fanatica.
Febris ardentissima.

VIERUS, De Præstig. Dæm. iii. c. 35.
(Ab interno usu.)

Vesicæ cruciatus atrox.
Sanguinis mictus copiosus.

JOACH. CAMERARIUS, apud SCHENCK, lib. vii. obs. 127. (Ab interno usu.)

Tormina gravia.
Mictus cruentus.
Vesicæ ardor.
Dolor ventriculi.
[5] Anxietas magna.
Frigus extremorum.
Urinæ retentio.
Pulsus deletus, ratione constante. (Mors post 36 horas.)

BACCIUS, apud eundem, ibid. obs. 128.
(Ab interno usu.)

Corrodens ventriculi dolor.

(Ab externo usu.)

Ischuria gravis.
Ardor urinæ.
Mictus sanguinis.

Miscell. Nat. Cur. Dec. II. Ann 8. p. 193.
(Ab usu interno.)

Aphthæ artificiales.

SAM. LEDELIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 9, 10, obs. 148. (Ab usu interno.)
Tumor scroti.
Sanguis, loco seminis, excretus.

Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 2.
Dolorifica urinæ retentio.

Ibid. Dec. II. Ann. 10, App. p. 60.
Ardor in genitalibus.
Perpetua micturitio cum dolore intolerabili.
Dolor cordis.

CULLEN, Arzneimittell. ii. p. 622. (Ab interno usu.)
Ventriculi dolor vehemens.
Febris species.

G. F. HILDANUS, Obs. 99.
(A 12 cantharidibus devoratis.)
Dolores ventriculi.
Tormina.
Dolores renum.
Dolores totius corporis.
[5] Mictus cruentus, dolorosus.

JOS. LANZONI, Opera, tom. iii. animadv. 18, p. 478. (Ab usu interno.)
Dolor vesicæ.
Maxima urinæ difficultas.
Inflammatio penis. (In cadavere inventa sunt vesica, urethra, renes exulcerata.)

PETR. FORESTUS, Obs. lib. xxx. obs. 6. (Ab usu interno.)
Erosio ab ore ad anum usque.

Ex ore halitus picis cedriæ instar.
Præcordia dextra inflammata.
Ischuria.
[5] Mictus sanguineus.
Dysentericæ sedes strigmentosæ.
Fastidia.
Animæ deliquia.
Vertigo (fatalis).

G. F. HILDANUS, Obs. 98.
(Ab usu externo, in genu tumido.)

Inquietudo.
Febris.
Renum, lumborum dolor maximus.
Ventris totius dolor.
[5] Dysuria vehemens.
Ardor urinæ tantus, ut sine cruciatu et ejulatu ne guttulam quidem urinæ sanguinolentæ emittere posset.

Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 7. obs. 86.
(Ab usu externo in nuchâ.) (Post curatam urinæ incontinentiam.)

Lethalis diabetes.

WERLHOFF, Opera, p. 699.

Urina sanguinolenta, parum grumosa.
Urina pituitosa.
Stranguria.

STALPAART van der WIEL, Cent. I. obs. 83.
(Ab usu externo.)

Dolor vehementissimus inter micturitionem continuam. (Post paucas horas.)

CAPSICUM ANNUUM L.

(Siliquarum totarum pulveris tinctura.)

Vis sedecim, ad summum viginti quatuor horas durat.

Inebriatio.

(Ex somno expergiscenti infatuatio capitis, quasi se ipsum non nosceret).

Vertigo, titubatio a latere ad latus.

Oscitatio.

5 (Mane major lassitudo, quam vesperi).

Lassitudo ingens, non dormituriens. (Aliquando circa secundam horam observavi.)

Debilitas tremula in pedibus.

Calor imminutus pedetentim.

Frigus post levem lecti remotionem.

10 Horripilatio in tergo vespertina, nec calore, nec siti, sed sudore miti subsequo.

Frigiditas per totum corpus, extremitates frigidæ, sine horrore.

Frigiditas crescens, cum animi ægritudine et pupillæ contractione. (A quartâ ad decimam quintam horam crescentem frigiditatem vidi, et inde ad vigesimam quartam usque iterum decrescentem.)

Frigiditas scroti, impotentia virilis.

Frigus ventriculi, sensus in eo quasi ab aquâ frigidâ, (tum sensus quasi a tremore).

15 Tremor ex horrore.

Siccitas oris.

Sapor insulsus; postea *Soda.*

Pituita tenax oris.

Sapor in ore quasi ab aquâ putridâ.

20 Sitis nulla.

Fames nulla, anorexia.

Taciturnitas.

Fuga motus.

Adiaphoria.

25 Tædium, morositas.

Morositas taciturna cum pertinaciâ.

Reluctantia ejulans. (Circa tertiam horam aliquando observatum.)

Animus, inter jocos ipsos, minima ægre ferens.

Animus opprobrians, vitia aliorum magni faciens, parva ægre ferens, reprehendens.

30 Somnus insomniosus.

Somnus clamoribus interruptus et pavoris insultibus quasi ob casum ab alto.

Somnus cum inspiratione, sibilo stertoroso per nares stipata, et suffocationis nasalis accessibus. (Circa primam horam observatum.)

Tædium et morositas post somnum cessant.

Angor alte respirare cogens.

35 Alta respiratio, suspirii instar.

Asthma inter requiem et motum.

Asthma, sensus plenitudinis in pectore.

Asthma quasi a ventriculo proficiscens.

Orthopnœa.

40 Dolor costarum et sterni in respiratione.

Dolor pulsatorius in pectore.

Dolor constrictorius pectoris, respirationem angustans, motu parvo auctus. (Circa quartam horam observatum.)

Asthma inter eundem.

Asthma vel inter quietem, rigiditas dorsi inter pronationem dolorosi, respiratio hinc inde alta, suspiriosa, tussicula sicca.

45 *Dolor tensivus ex abdomine in pectus tendens, sensus quasi ab intumescentiâ abdominis.*

Sensus distentionis abdominis ad diruptionem usque, suffocationem minitans. (Circa secundam horam observatum.)

Dolor in respirando punctorius intra scapulas et in regione ventriculi, punctus singuli in latere abdominis, in osse ensiformi, et in sterno, qui vero externi videntur.

Sensus tractorius in pectoris latere ad collum usque inter tussiculam.

Tussicula creberrima.

50 Tussicula sicca crebra.

Tussicula maxime post coffeæ potum.

Tussis dolorosa.

A tussi et sternutatione dolor micans hinc illinc.

Halitus exspirationis in tussi sapore aliquo alieno præditus.

55 Anima inter tussim fœtida.

Post decubitum vesperi titillatio in larynge, et tussicula sicca.

Raucedo.

Gravedo matutina.

Titillatio in naribus gravedinosa.

60 (Epistaxis, mucus narium sanguinolentus).

Pustulæ dolentes in narium orificio.

Salivatio.

Dolor lacerans in auris conchâ.

Dolor pruriens in intimo auris recessu. (Non nisi decimâ sextâ horâ observatum.)

65 *Dolor pressorius in intimâ auris parte.* (Primâ et octavâ horâ observatum.)

Dolor infra aurem.

Labii tumor.

Labiorum fissuræ.

Gingivæ tumor.

70 Dentes hebetes, elongati.

Dolor strictorius in gingivis.

Dentis dolor strictorius, nec tactu, nec pastu auctus.

Dolor pressorius in oculis.

A motu capitis et itione in temporibus dolor quasi cranium dirumperetur.

75 *Dolor pulsatorius in temporibus* (*sinistris*).

Dolor pulsatorius in fronte.

Dolor pressorius in temporibus.

Dolor pressorius in fronte.

Dolor punctorius in capite.

80 *Dolor capitis punctorius magis, quam lacerans, requie pejor, motu pacatior.*

Dolor in capite pulsatorio terebrans.

Dolor capitis distendens, seu quasi a plenitudine.

Dolor capitis in fronte distendens.

Dolor strictorius in fronte.

85 (Cephalalgia lacerans).

Dolores hinc inde in facie partim osteocopi, tactu excitandi; partim subtiles penetrantes (nervosi) inter capiendum somnum excruciantes.

Cephalalgia pressorio lancinans unius lateris resupinatione oculorum vel pronatione aucta (una cum oblivione), more hemicraniæ hystericæ, nausea stipata.

Dolor in colli parte externâ.

Dolor in pharynge inter deglutitionem.

90 Dolor inter deglutitionem ut in anginâ, extra deglutitionem dolor strictorius in gulâ.

Dolor pressorius in scrobiculo cum vomituritione.

Dolor pressorius in scrobiculo cum vomituritione, menstrui tempore.

Vomituritio.

Post partum plenitudo et augustia pectoris, tum vel ructus acidi, vel soda; tandem alvus cita mollior.

95 Soda.

Dolor ardens in ventriculo ad os usque, post jentaculum.

Tensio pressoria abdominis, maxime regionis epigastricæ, inter scrobiculum et umbilicum motu inprimis aucta, una cum tensione pressoriâ in infimâ parte dorsi.

Statim post pastum tormina pressorio forficantia cum flatuum incarceratione.

Dolor pressorius in abdomine hinc inde.

100 Dolor pressorius in hypochondriis et infra scrobiculum.

Tormina quasi a flatibus in hypogastrio.

Post tormina in hypogastrio flatuosa, parum torminosa, sedes parvæ, crebræ, ex pituitâ constantes, interdum sanguine intermisto, tenesmodæ.

Diarrhœa torminosa, pituitæ tenacis, interdum sanguine atro intermisto, torminibus discindentibus et contorquentibus circa umbilicum; post singulam sedem sitis, et post haustus singulos horror.

Sedes parvæ, meræ pituitæ.

105 Sedes parvæ pituitæ sanguinolentæ.

*Tenesmus.**

*Dolor ardens in ano.**

*Pruritus in ano.**

*(Post tertiam, circa quartam et octavam horam observatum.)

*Tenesmus vesicæ, micturitio.**

110 *Ardor urinæ.**

*(Circa quartam et octavam horam observatum.)

Extra mictum lancinatus in urethræ orificio.

Statim post mictum punctorius dolor in urethræ orificio.

Sensus vulsorius in nuchâ.

Sensus rigiditatis in nuchâ dolorosus, motu tantum sensibilis.

115 Dolor tractorius in dorso.

Dolor strictorio pressorius in dorso.

Dolor dorsi inter pronationem.

(Dolor simplex in costâ parvi spatii, tactu maxime exasperandus, neutiquam tussi, nec respiratione).

(Dolor strictorio paralyticus supra et infra cubiti articulum).

120 Dolor tensorius in genu.

Tensio genuum.

Fragor juncturarum, genuum, digitorum.

Dolores rheumatici plurium horarum volatiles, motu excitandi, hinc inde in artubus, dorso, nuchâ, scapulis, manibus.

Articulationum omnium rigiditatis sensus et dolor simplex, in motus principio summus, inter motum continuatum mitigatus, cum pituitæ tenacis catarrho in bronchiis.

125 Reptatio hinc inde in cute quasi a muscâ.

Dolores pressorii hinc inde, volatiles.

Calor et una horripilatio cum siti aquæ.

(Calor internus cum sudore frigido frontis).

Rubor genarum.

130 Meridie post pastum rubor genarum, manibus et pedibus frigidis, sine horrore. (Post duos dies continuos observatum; primâ vice post quatuor horas enatum.)

(Ardor genarum, manuum, pedum, genæ tumor).

Cum ardore in buccis, micans sursum deorsum sensus indolorificus. (Dehinc fere incipiunt secundi ordinis symptomata.)

Agrypnia. (Intra quintam et sextam, sic et intra nonam et decimam horam observatum.)

Evigilationes post mediam noctem.

135 Insomnia impedimentorum plena.

Inquietudo negotiosa. (Post aliquot horas observatum.)

Sedulitas inquieta.
(Proclivitas in terrorem).
(Constipatio quasi a calore magno in abdomine).
140 *Sensus omnes auctiores.*
Ophthalmia.
Animus contentus.*
Ludibria.*
*(Intra octavam et vigesimam quartam horam observatum.)
Animus contentus, jocosus, in stomachationem brevem, datâ nimiâ occasione apprime pronus.

OBSERVATA ALIORUM.

BROWNE in MURRAY's Appar. Med. i. p. 703.

Tenesmus.
Ardor ani.

FORDYCE, apud eundem, ibid. p. 704.

(Interne et externe adhibitum.)

Blennorrhœa urethræ.

MATRICARIA CHAMOMILLA.†

(Herbæ totius succus calore solis inspissatus.)

Vis ad summum 28 horas durat.‡

Oscitatio crebra, interrupta. (Post quadrantem horæ observatum.)

Frigiditas, ut plurimum cum horrore a tergo ad abdomen reptante. (Primâ et quartâ horâ observatum.)

Horror singularum partium in facie, in brachiis, sine et cum frigiditate externâ. (Semi-horâ observatum.) (Secundâ horâ observatum.)

Horror singularium partium non quidem frigidarum, cum somnolentiâ. (Post secundam et dimidiam horam observatum.)

5 Frigiditas manuum, sudor frigidus volarum, corpore reliquo juste calido. (Secundâ horâ observatum.)

Horrescentia aeris frigidi. (Secundâ horâ observatum.)

Cum horrescentiâ amblyopia.

A denudatione horrescentia.

Animi deliquiorum accessus plus minus repetiti. (Semihorâ, horâ tertiâ, quartâ, quintâ observatum.)

10 Lassitudo et debilitas maxima ad syncopem accedens. (Quartâ horâ observatum.)

Lassitudo, pedum maxime. (Decimâ horâ observatum.)

Debilitas inter requiem major, quam per motum; inter motum robur sufficiens.

† Operationis suæ curriculum paroxysmis aliquot horarum, vires utriusque ordinis complectentibus absolvit, spatiis liberis vel remissionibus interjectis, ita tamen, ut in paroxysmis prioribus vires primi ordinis, in posterioribus vires secundi ordinis potissimum dominentur.

‡ Hoc remedium vires retinet per aliquot dies.—*Ed.*

Fuga laboris.

Vertigo maxime inter loquendum. (Horâ decimâ sextâ observatum.)

15 (Vertigo inter pronationem).

Accessus breves vertiginis syncopalis. (Ab odore florum et extracti interno usu post quadrantem horæ observatum.)

Vertigo syncopodes.

(Vertigo mututina).

Stupiditas cum vertigine.

20 Dormituritio diurna et lassitudo.

Stupor mentis lætitiæ expers (achæria) dormituriens, a somno tamen alienus.

Coma vigil, vel potius impotentia, oculos aperiendi, cum exspiratione citâ, sopore somni experte et cephalalgiâ frontis lacerante, vomituritiva. (Sesquihorâ observatum.)

Intelligentiæ hebetudo, vis perceptionis imminuta. (A quartâ ad sextam horam sæpius observatum.)

A meditatione levi languor.

25 Somnolentia maxima. (Post tres quadrantes horæ ad sesquihoram usque observatum.)

Dum sedet, (diurna) somnolentia; dum decumbit, insomnia vigil.

Vis perceptionis et intelligentia habetata surditate quadam, vel insomniis vigilibus. (Ante secundam horam observatum.)

Inattentio cogitationibus immersi (ideæ distractæ).

Cogitationes, ideæ evanescentes.

30 Scotomiæ lateralis sensus, dum oculi in rem albam figuntur.

Balbuties, verborum inconcinna commutatio. (Quartâ circiter horâ observatum.)

Imaginatio, voces absentium exaudire opinantis.

Agrypnia, angoris accessibus stipata, visionibus lucu-

lentis et graphicis phantasiæ obversantibus: (Per primas quatuor horas observatum.)

Delira blateratio de impedimentis variis removendis.

35 Convulsivæ vulsiones singulæ incipiente somno.

Vulsiones in artubus, palpebris.

Febris soporosa (matutina) cum vulsionibus singulis artuum, capitis.

Expavescentia tremula.

Anxietas tremula cum palpitatione. (Primâ horâ observatum.)

40 Congestio sanguinis ad cor. (Statim post potam chamomillam.)

Disphoria immanis, jactatio, agitatio ferox quasi moribundi, cum lacerantibus abdominis doloribus, tum stupiditas, tum dolor capitis ferox. (Primâ horâ sæpius observatum.)

Hypochondriaca anxietas.

Pupillæ contractiores. (Ut plurimum intra primas quatuor horas.)

Cordis oppressio, cum æstuatione, ejulatu et sudore immani.

45 Non nisi gestatus quiescere potest infans.

Infans pedibus insistere et incedere detrectat, misere ejulando. (Quartâ horâ observatum.)

Lacrymatio.

Ejulatus ob injuriam levem, vel imaginariam, vel jam diu præteritam. (Secundâ etiam horâ observatum.)

Ejulatus ob petita negata miserabilis. (Tertiâ horâ observatum.)

50 *Inquietudo lacrymabunda varia efflagitans et oblata negligens, respuens.* (Quartâ horâ ab odore florum observatum.)

Morositas per duas horas durans.

Animus ad iram, contentionem, rixam paratus, pronus. (Secundâ horâ vidi.)

Morositas ad rixam prona. (Aliquando duodecimâ horâ observatum.)

Suspicio injuriari se putantis.

55 Morositas; omnia ab aliis facta ipsi displicent, nulla aliorum facta ipsi grata.

Intolerantia interpellationum, oblocutionum, maxime post somnum, pupillis ægre dilatabilibus et contractilibus. (Decimâ horâ observatum.)

Deliquescentiæ sensus in cordis regione.

Deliquescentia cordis nauseabunda.

Nausea vomituriens ut a syncope nascitura.

60 Nausea vomituriens, matutina.

Syncopes species, deliquescentia cordis nauseabunda; pedes subito quasi paralytici, stupor artuum.

Rigiditas stuporifica brachiorum, dum manus aliquid capessit.

Rigiditas et narcosis manuum frigidarum paralytica, cum obnubilatione capitis, et hyperæsthesia aeris, quasi refrigerium sit nasciturum.

Nocturna pedis asthenia paralytica, vires in eo deficiunt, insistere eo nequit, inter surgendum concidit, cum dolore cruris strictorio, plantæ dolore surdo.

65 Dolor in periosteo artuum cum astheniâ paralyticâ.

Dolores spurii ab osse sacro per femora tendentes, strictorio paralytici. (Primis horis observatum.)

Dolor omnium artuum, maxime inter motum, simplex, cum asthenia artuum, sine tamen vero lassitudinis sensu.

Sensus in cruribus quasi a narcosi nascitura.

Dolor strictorio paralyticus in cubito et manibus.

70 Narcosis manuum et pedum, quasi gelu confecti essent. (Quintâ horâ observatum.)

Lacerans dolor cum formicatione in brachii ossium tubis ad digitos usque et sensu stuporis (narcoseos) quasi brachium sensu tactus careret.

Dolor pollicis et digiti indicis, qualis a distortione, sive a nimio laboris nisu remanet, seu quasi a confractione, cum astheniâ paralyticâ, inter motum percipiendus.

Dolor strictorius in carpo.

In genu strictorio-lacerans dolor ad malleolos pertingens.

75 Dolor strictorius in manibus, scapulis, pectore, ut a refrigeratione. (Horâ quintâ et decimâ sextâ observatum.)

Dolor strictorius in dorso per unam horam. (Post primam horam observatum.)

Dolor tensivo lacerans in dorso.

Dolores punctorii in dorso.

Dolor lacerans in femoribus et cruribus.

80 Contractio digitorum pedis spasmodica, inter lacerantem artuum dolorem.

Dolor lacerans in confiniis claviculæ et colli. (Horâ secundâ observatum.)

Vespertini accessus dolorum lacerantium.

Dolores strictorio lacerantes uno ictu et rari in artuum ossium tubis vel tendinibus.

Pedum dolor lacerans, lecto obtegi recusantium.

85 Dolor lacerans in auribus.

(Dolor lacerans in auriculâ dextrâ).

Lancinatus singuli in aure, maxime inter pronationem, cum animo minima ægre ferente.

Obtusa pressio in aure internâ inter pronationem, quasi ab ictu.

Obturationis aurium sensus et susurrus, quasi avis pedibus radat et scalpat.

90 In aure susurrus, quasi ab aquâ cadente.

Tinnitus aurium. (Primâ horâ observatum et tertiâ et quartâ.)

Lancinatus singuli in maxillâ ad aurem internam usque.

Dolor lacerans in maxillâ, ad aurem tendens, cum genæ tumore.

Odontalgia strictoria in mandibulâ inferiore prorsum versus. (Semi-horâ observatum.)

95 Dentium dolor, cum salivatione, hinc illinc micans, et ad oculos tendens, frigidæ aquæ (multæ), admotione mox exasperatus.

Dentium dolor lacerans et lancinans per digitum aquæ frigidæ intinctum paulisper sedandus, vesperi. (Nonâ et decimâ horâ observatum.)

Post pastum et potum, maxime calidum (etiam frigidum) vel statim, vel post minutam nascens odontalgia.

(*Odontalgia post haustum calidum* (maxime coffeæ) potum sæviens).

Odontalgia post pastum etiamsi neuter neque calidus, neque frigidus sit. (Inter reliquias observavi.)

100 Dentium dolor strictorius, post pastum vel potum.

Dentium dolor a calidâ admotâ.

In dentibus dolor, incerti loci, strictorius, inter cibandum evanidus, noctu maxime ingravescens; dentes elongati.

Dentium vacillatio.

Dentium dolor, cum genæ tumore.

105 Formicatio in dentibus maxillæ superioris.

Odontalgia discindens.

Gingivæ tumor.

Strictorius dolor in palato versus fauces.

Dolor lacerans in fronte per vices reiterans.

110 *Hemicrania strictorio lacerans.* (Tertiâ et quartâ horâ observatum.)

Hemicrania in temporibus alterutribus lacerans.

Dolor lancinanti lacerans in fronte, in pectus tendens.

Lacerans et lancinans dolor capitis per tempora penetrans.

Lancinatus singuli in hemicranio dextro et ab alterutrâ parte in cerebro. (Undecimâ horâ observatum.)

115 Lancinatus singuli in cerebro.

Hemicrania lancinans ut a refrigerio.

Dolores punctorii in capite.

Dolor capitis punctorius, quasi oculi casuri essent.

Hemicrania volatice pulsatoria.

120 *Cephalalgia pulsatoria.* (Post decimam quartam horam observatum.)

Pulsationes aliquæ in capite. (Primo quadrante horæ observatum.)

Gravitas capitis.

Dolor capitis ex gravitate et contusione compositus. (Tertiâ horâ observatum.)

Fragor crepitans in hemicranio sinistro.

125 In oculis lancinatus.

Marginis in palpebrâ superiore et inferiore siccitas summa, glandularum meibomianarum secretio suspensa. (Primâ horâ observatum.)

Oculi cantus mane purulentus.

Oculus mane tumidus, pure conglutinatus.

Dolor pressorius in oculis, oculi inflammati, mane purulenti.

130 Post somnum palpebræ conglutinatæ.

Frigiditas genarum, manuum et pedum gelida, cum frontis, colli, pectoris calore ardente, quo postea in genam dextram progresso cum rubore, manus et pedes iterum calorem justum acquirunt, pupillis contractis, non dilatabilibus; tum somnus stertorosus. (Hæc intra horam primam et tertiam observavi.)

Frigus totius corporis, cum calore faciei, per oculos micante.

Extremitates frigidæ, cum calore faciei ardente, calore ardente in oculis, et halitu perquam calente. (Quintâ horâ observatum.)

Sensus quasi calor et ignis per oculos micaret.

135 Scintillatio in visu.

Post potum et pastum calor et sudor faciei.

Vesperi ardor in genis, una cum horroris accessibus volaticis.

Gena rubra alterutra, sine horrore, sine calore interno, per vices reiterans. (Quartâ et duodecimâ horâ observatum.)

Horror posterioris faciei, corporis, brachiorum, femorum, dorsi, per accessus repetens, sine frigiditate externâ, immo cum caloris interni, sicci sensu et calore externo, maxime frontis et faciei.

140 Sudores volatici crebri faciei et volarum manus.

Faciei, colli, manuum sudor. (Sextâ horâ observatum.)

Gemitus involuntarii inter calorem faciei.

Gemitus singuli inter somnum, cum sudore frontis calido, viscido.

Capitis maxime sudor inter dormiendum.

145 Ardor pedum cum pruritu ut in gelatis fieri consuescit. (Tertiâ horâ observatum et tamen dubium, an ad vires secundi ordinis sit referendum.)

Calor internus, una cum horrore.

Calor externus, una cum horrore.

Caloris externi sensus sine calore externo. (Primâ horâ observatum.)

Caloris sensus, sine calore externo et sine siti.

150 Delira blateratio, nocturna vigil, inter sessum.

Siccitatis linguæ sensus, cum siti aquæ, anorexia, calore volatico, sudore faciei, et palpitatione cordis; fame caninâ subsequâ.

Sitis vespertina et expergiscentia nocturna cum dolore.

Sitis inextinguibilis, lingua sicca. (Quintâ horâ observatum.)

Ob caloris externi sensum stragulorum intolerantia.

155 Somnus insomniosus phantasticus.

Insomnia luculenta, quasi historia vigilando ageretur.

Vagitus inter somnum.

Ejulatus inter somnum.

Concussiones, æstuatio, ejulatus, blateratio inter somnum. (Sextâ horâ observatum.)

160 Nocturna jactatio æstuans in lecto cum phantasiis.

Dolor ossis sacri, maxime nocturnus.

Inspiratio stertorosa inter somnum.

Inspiratio stertorosa inter somnum, citior quam exspiratio, ore aliquantum aperto et sudore frontis calido, viscido. (Tertiâ horâ observatum.)

Maxima anxietas in lecto, non extra, et pupillæ tum citissime mobiles.

165 *Labii inferioris medium rhagade fissum.* (A tertiâ ad decimam usque horam observatum.)

Exulcerationes crustosæ in labiorum margine. (Inde a primâ horâ ad quartam observatum.)

Mordacitatis insignis sensus in posteriori linguæ parte et velo palatino. (Primâ horâ observatum.)

Vesiculæ supra et infra linguam punctorio lancinanti dolore.

Pulsationes aliquæ in pharynge. (Post quadrantem horæ observatum.)

170 Faucium dolor simplex, motu partium, colli et deglutitione auctus.

Angina parotidea.

Salivatio. (Quartâ et sextâ horâ observatum.)

Sapor mucaginosus. (Secundâ et duodecimâ horâ observatum.)

Dentes mucaginosi.

175 Screatus putridi saporis.

Sapor acidus in ore. (Tertiâ et decimâ octavâ horâ observatum.)

Sapor acidus panis.

Anorexia.

Anorexia coffeæ.

180 Sapor et appetitus deletus, escæ quodammodo descendere detrectant.

Nulla cibi appetentia, nullus ciborum gratus sapor.

Anorexia quasi a fastidio cibi, sapore non corrupto.

Vesperi escæ ad scrobiculum colli quasi adscendunt, ibique subsistunt, cum plenitudine, nauseâ vomituritivâ et ructibus.

A cibo capto vertigo.

185 A cibo capto pressio in hypochondriis, ventriculo.

A cibo capto plenitudo ventriculi satura, vel in crastinum diem; vomituritio.

A pastu abdomen intumescens.

Nausea vomituriens cum salivæ in ore affluxu.

Nausea post pastum.

190 (Vomitus sine ructibus præviis).

Eructatio escarum. (Quintâ horâ observatum.)

Post pastum plenitudo, angor et dôlor lacerans dorsi in abdomen tendens.

Angustia pectoris, quasi a flatibus in epigastrio, cum pressionis sensu restagnantibus et ventriculi dolor, quasi a sodâ nascitura, postea ardor in spinâ dorsi.

Restagnatio flatuum in hypochondriis. (Inter reliquias aliquando observatum.)

195 Colica flatulenta. (Primâ horâ et aliquot horis post observatum.)

Pressorius in ventriculo dolor quasi a lapide casuro. (Primâ horâ observatum.)

Dolor pressorius ventriculi et hypochondrii, respirationem angustans, maxime post potam coffeam.

Glocitatio in latere ad abdomen usque.

Per intervalla rodens colica, hypochondrio flatibus obsesso, lancinantibus pectus pervadentibus. (Circa horam octavam observatum.)

200 Strictorius in abdomine dolor.

Tormina forficanti lacerantia in umbilico et infra ad utrumque latus, cum dolore ossis sacri, quasi a confractione. (Primâ horâ et aliquot horis post observatum.)

Dolor lacerans continuus in abdominis latere, concentratus quasi in globum.

Dolor in abdomine torminosus, qualem in constipatione alvi exoneratio causat.

Molestia in abdomine, quasi a constipatione. (Quartâ horâ observatum.)

205 Angor quasi ab alvo deponendâ.

Constipatio, quæ ab intestini recti inertiâ proficiscitur, ita ut alvus non nisi abdominalium musculorum nisu extorqueri queat. (Quartâ horâ observatum.)

Abdomen durum tumidum.

Diarrhœa aquea cum (et sine) torminibus discindentibus.

Excrementa muco obducta, vel et in interstitiâ muco insinuato.

210 *Diarrhœa torminosa mere albo mucosa.* (A primâ ad tertiam horam observatum, hoc et priora duo ad secundi ordinis vires referenda videntur.)

Proctalgia lancinans post sedem singulam.

Impetus in annulum abdominalem, quasi a debilitate temporariâ hujus partis, ut in herniâ nasciturâ. (Ante quartam horam observatum.)

Impetus in uterum, dolorum ad partus instar, cum micturitione creberrimâ.

Menstrui suppressio cum scrobiculi tumore et scrobiculi pressione anxiâ, tumore abdominis, doloribus quasi ad partum et hydrope cutaneo.

215 *Blennorrhagia vulvæ flava, mordicans.*

Pruritus scroti. (Sextâ horâ observatum.)

Molimina hæmorrhoidum cœcarum. (Duodecimâ horâ observatum.)

Hæmorrhois cœca.

Dolor lancinans in vesicæ collo extra mictum.

220 Ardor in vesicæ collo inter mictum.

Angor inter mictum sine impedimento mechanico.

Angor cum micturitione frustraneâ, sine lotii copiâ.

Mictio involuntaria. (Tertiâ et quartâ horâ observatum: an viribus secundi ordinis accensendum?)

Obturatio narium gravedinosa. (Primâ horâ observatum.)

225 Coryza quinque ad octo horas durans. (Secundâ horâ observatum.)

Ardor in gulâ.

Dolor ardens in sterno ad os usque.

Stridulatio bronchiorum in respiratione.

Raucitas a pituitâ viscida caput laryngis occupante, screatu valido abigenda. (Horâ octavâ observatum.)

230 *Raucitas catarrhosa arteriæ asperæ et siccitas palpebrarum.* (Intra primas octo horas observatum.)

Raucedo, tussis ob mucum in superiori tracheæ parte stridulantem, cum dolore in eo loco, ubi mucus a tussi abrasus fuerat. (Secundâ horâ observatum.)

Tussis sicca quater, quinquies de die.

Tussis valida, sicca inter somnum. (Undecimâ horâ observatum.)

Tussis sicca ob pruritum et titillationem continuam in eâ parte tracheæ, quæ scrobiculo colli subjacet. (Quartâ horâ observatum.)

235 *Asthma strangulatorium circa colli scrobiculum, cum irritatione continuâ ad tussim.* (Primo quadrante horæ observatum.)

Constrictio superioris pectoris tractus, inter tussiendum dolorifici. (Quartâ horâ observatum.)

Constrictio pectoris.

Angustia pectoris.

Dolor strictorius, seu intustractio reiterata in pectore dextro.*

240 Dolor pressorius in sterno, respirationem non angustans, nec respiratione, nec tactu auctus.*

*(Duodecimâ et decimâ sextâ horâ observatum.)

Dolor pressorius in sterno, respirationem angustans.
*(Duodecimâ horâ observatum.)

Acupunctio in pectore.

Lancinatus singuli, volatici in pectore. (Decimâ sextâ horâ observatum.)

Lancinatus per transversum pectus; inter singulam respirationem.

245 Lancinatus post singulam exspirationem e sterno ad latus dextrum micans. (Secundâ et quartâ horâ observatum.)

Dolor ex pruritu et lancinatione compositus, hinc inde, parvo spatio circumscriptus, scalpendo dolorificentior. (Quartâ horâ observatum.)

Miliaria rubra in genis.

Erythemata parva cutis, miliaribus papulis obsessa.

Rigiditas universalis volatica.

250 Articulationum omnium dolor, inter motum, simplex, quasi rigidæ essent et diffringerentur. (Sextâ horâ observatum.)

Crampus in suris.

Dolor crampoides, tensivus in surâ inter motum. (Octavâ horâ observatum.)

Crepitus et dolor juncturarum, maxime inferiorum artuum, quasi a contritione, nec tamen lassitudo completa. (Octavâ horâ observatum.)

Sensus in femoribus quasi a verberatione volaticus. (Post quadrantem horæ observatum.)

255 Musculorum abdominalium dolor quasi a verberatione. (Nonâ horâ observatum.)

Cutis fit ulcerosa id est, *in exulcerationem prona.*

Dolor auctus in ulcere, si quid adest. (Post tres quadrantes primos horæ observatum.)

In ulcere, si quid adest, vulsorius et lancinans dolor.

In ulcere, si quid adest, *ardens et mordax dolor nocturnus, cum formicatione in eo et hyperæsthesiæ inter tactum.*

260 Glandularum mammæ scirrhosa durities. (Post plures horas observatum; cui ordini virium hoc et sequens accensendum sit, dubium.)

Nodus durus sub papillâ mammæ, tactu dolorosus, interdum per se dolore strictorio lacerante.

Rei venereæ appetentia. (Post plures horas observatum; dubium an ad vires secundas sit referendum.)

Pollutiones nocturnæ.

Epistaxis.*

265 Hæmorrhois fluens.*

Hæmorrhagia uteri vel in decrepitis.*

*(Inter vires secundi ordinis referenda videntur.)

Vesicæ urinariæ vis imminuta, urinæ radius languidus. (Post horam vigesimam observatum.)

Cogitationes altæ, seriæ, cum animo composito, æquo.*

Ideæ fixæ.*

*(Inter vires secundi ordinis referenda videntur.)

270 Vi perceptionis et intelligentiæ redeunte et sopore evanido, pupillæ fiunt dilatabiliores. (Ut plurimum inde a septimâ horâ.)

Pupillæ perquam mobiles, citius tamen contractiles. (Inter reliquias observavi.)

Dolor quasi ab excoriatione, in cantis oculorum externis, labiis excoriatis. (Non nisi inter reliquias observavi altero nychthemero, dubium utri ordinum sit accensendum?)

OBSERVATA ALIORUM.

SENAC, de Recondita Febrium Interm. et Rem. Natura, p. 188.

Mordacem calorem accendit.

CULLEN, Arzneimittel. tom. ii. p. 94.

Alvi dejectiones.

PRINGLE, MONRO, LIND. ROSENSTEIN.

Vomitus.

CINCHONA OFFICINALIS L. ET REGIA.†

(Pulveris Corticis Tinctura.)

Vis ad summum viginti horarum.‡

Pallor.

Frigiditas universalis.

Sudor frigidus per totum corpus. (Post semi-horam observatum.)

Frigiditas (frigus) manuum, pedum, nasi.

5 Sudor frigidus faciei, cum siti.

Sudor capillorum.

Oscitatio.

Obturatio auris interna. (Horâ primâ observatum.)

Pituita caput laryngis obsidens, raucam et cavam vocem vocisque sonos absonos et nimis altos reddens. (Post duas horas observatum.)

10 Suffocationis paroxysmus quasi a pituitâ caput laryngis occupante, maxime circa vesperam et inter evigilationem e somno. (Post octavam horam aliquoties observatum.)

Pandiculatio.

Dormituritio diurna.

Sternutatio.

Sternutatio paroxysmum febrilem incipiens.

15 Stupor membrorum. (Primus gradus narcoseos.)

Lassitudo.

† Easdem apprime vires a C. regiâ, quales a Chinâ vulgari officinali, observavi.

‡ Experimenta recentiora monstrant vires Cinchonæ ab paucis diebus ad plures hebdomadas retineri posse.—*Ed.*

Vapiditas capitis et torpor corporis quasi ex pervigilatione et insomniâ. (Horâ primâ observatum.)

Idearum processio tarda.

Languor animi et corporis.

20 Muscæ volitantes ante visum. (Quartâ horâ observatum.)

Ægrotatio; omnino non bene valet.

Facies hippocratica; apex nasi acutus, oculi cavi, nimbis lividis, indifferentia, insensibilitas, externorum, immo amicissimorum objectorum contemtus.*

Oculi in somno, hic semi-clausus, ille apertus, globis oculorum retortis, morientium instar.*

*(Circa primam horam observatum.)

Manus hæc gelida, illa calida.

25 Ejulatus raucus, miserabilis. (Circa primam horam observatum.)

Pupillæ contractæ.

Frigiditatis sensus in ventriculo.

Vapiditas et sensus vacui in ventriculo.

Hypererethismus, cum pusillanimitate et intolerabilitate strepitus.

30 Sensorii nimia teneritudo et hyperæsthesia, ita ut ex asperetur et offendatur animus per visus, olfactus, auditus, gustus objecta. (Aliquando quartâ horâ observatum.)

Animus male contentus, infelicem se, et impediri et excruciari ab omnibus hominibus putantis. (Post quinque horas observatum.)

Circumspectio nimis sollicita.

Cura anxia et nimis sollicita ob minima. (Post sesquihoram observatum.)

Morositas querela.

35 Morositas suspiriosa.

Inobedientia.

(Taciturnitas pertinax, respondere detrectat).

Stomachatio, indignatio, irascentia, animus exasperatus. (Quartâ horâ observatum.)

Indignans hæsitatio. (Post aliquot horas observatum.)

40 Jactatio atrox et æstuatio desperabunda.

Dolorum pristinorum renovatio.

Doloris præsentis augmentum.

Cardialgia pressorio-corripiens.

Fames canina cum sapore fatuo in ore.

45 Post pastum plenitudo diutina ad gulam usque.

Post cibum captum expansionis abdominis sensus quasi a plenitudine.

Post pastum dormituritio.

Pressio in ventriculo post pastum.

Inappetentia ciborum, potulentorum.

50 *Inappetentia ciborum, sapore integro.*

Inappetentia ciborum, inter vescendum tamen redit appetitus et bene sapiunt escæ. (Post sex horas observatum.)

Satietas escarum, potulentorum, tabaci, sapore grato, integro. (Post paucas horas observatum.)

Anorexia cerevisiæ.

(Sapor panis fusci acidus). (Post tres horas observatum.)

55 Sapor salinus in ore.

Nausea summa vel minus ingratorum, etiam absentium, cum laboris fugâ, somnolentiâ continuâ diurnâ et albugineâ icterode. (Circa octavam horam observatum.)

Vomituritio, vomitus.

Nausea et sanguinis ebullitio, ambo post cibum captum evanida.

Palpitatio cordis.

60 Palpitatio cordis cum dormituritione.

Congestio sanguinis ad caput, frons calida, artubus frigidis.

Rubor genarum, auricularum.

Rubor et calor alterutrius genæ et auriculæ, et hoc nondum penitus evanido, frigus supra totam cutem—dein supra inferiores artus. (Ante quintam horam observatum.)

Calor in facie et post aliquot horas horror, frigus, cum frigiditate totius corporis.

65 (Caloris per totum corpus sensus, venis tumidis, sine calore externo sensibili, pedibus frigidis).

Calor in toto corpore aliquantum auctus, venæ tumidæ, sine siti, pupillæ dilatabiles. (Circa octavam et circa duodecimam horam observatum; an ad vires secundi ordinis pertinet?)

Motu levissimo corporis excitatus sudor nuchæ et dorsi.

Infirmitas tremula artuum, tumque pupillæ dilatatæ.

(Reptatio in cute frontis).

70 Odontalgia cum vacillatione dentium. (Post tertiam horam observatum.)

Primo pulsatorius in aure sensus, dein tinnitus longus.

Susurrus aurium.

(Dolores lacerantes in auriculâ).

(Bullæ aqueæ pone aures).

75 Capitis dolor hinc illinc migrans.

Cephalalgia frontis ut a gravedine.

Dolor in nasi radice pressorius, ad latus migrans. (Quintâ horâ observatum, post calorem genæ evanidum.)

Cephalalgia temporum ut a gravedine.

(Capitis dolor, quasi cerebrum vulneratum esset, motu minimo capitis et capitis partium, maxime vero attentione et meditatione fixâ, et loquelâ auctus).

80 *Capitis dolor pressorio lancinans in fronte et temporibus unius lateris.* (Quartâ horâ observatum.)

(Labia fissilia).

Tumor dolorosus in latere radicis linguæ. (Post quartam horam observatum.)

(Dolores lancinantes volatici hinc inde in parotide).

Anginosa indeglutitio; dolor, tumor glandularum maxillarium, maxime inter deglutiendum percipiendus.

85 Tumor veli palati et uvulæ, sine dolore. (Post tres horas observatum.)

Sibilatio bronchiorum in respiratione. (Post secundam horam observatum.)

Sibilatio stertorosa per somnum.

Inspiratio gravis, difficilis, dolorosa, exspiratio cita.

Somnus stertorosus, ejulatorius infantum.

90 *Somnus insomniis gravibus, vel evigilantem angentibus.*

Expavescentia, maxime somnum capturi.

Somnus turbulentus, plenus insomniis, vociferationibus.

Dolor tracheæ, sterni in tussi.

Colica flatuosa. (Post duas horas observatum.)

95 Tormina forficanti lancinantia. (Circa sesquihoram observatum.)

(Dolores lancinantes volatici hinc inde in ventriculo, abdomine).

Tormina circa umbilicum cum horrore conjuncta.

Tormina eccoprotica.

Eccoprosis torminosa.

100 Diarrhœa prave concoctorum, lienteriæ species.

Proctalgia pressoria. (Circa sextam horam observatum.)

Pressio in vesicâ post nisum ad mingendum crebriorem, fere frustraneum.

Sensus strictorius in testiculis.

Glocitatio circa bulbum urethræ. (Post sex horas observatum.)

105 Nuchæ motus dolorosus.

(Dolor dorsi pulsatorio lancinans).

Narcosis artuum, quibus incumbitur.

Narcosis brachii anterioris inter flexionem (inter scri-

bendum), cum punctorio dolore in digitorum apicibus.

Dolor musculorum posteriorum femoris in sessu, quasi a contusione.

110 Dolor osteocopus juncturarum costarum in inspiratione, artuum, humeri, scapulæ quasi a contritione, motu maxime percipiendus.

Dolor dorsi et genu, quasi a verberatione inter motum levissimum. (Post tertiam horam observatum.)

Dolor ossis sacri intolerabilis quasi a crampo vel contritione aut verberatione inter motum levissimum clamores subitaneos extorquens. (Tertiâ horâ observatum.)

Dolor (simplex?) juncturarum in sedendo et decumbendo, quietem, et moram in uno loco diu tolerare impatientium, ejusmodi qui per iter maximum, lassitudinem summam vel seminis, aut sanguinis jacturam nimiam enervato evenire solet, et artus modo hinc, modo illinc movere, modo incurvare, modo extendere cogit.

Fragor juncturarum.

115 In vulnere (ulcere) dolorem fodienti diruentem causat. (Horâ primâ observatum.)

In vulnere (ulcere) lancinanti prurientem dolorem excitat per duas horas. (Post aliquot horas observatum.)

Amor laboris, lectionis, scriptionis, meditationis, assiduitas.*

Appetentia veneris.*

Appetentia rerum multimodarum, nescit quarum.

120 Pica.*

Idearum turba (projectantium) circa varias propositiones versantium.*

*(Dehinc vires secundi ordinis incipere videntur.)

Pupillæ mobiles, magis contractiles, quam dilatabiles. (Circa vigesimam horam observatum.)

OBSERVATA ALIORUM.

Morton, Opera, tom. ii. s. 76, 81.

Surditas aliqualis inter usum chinæ molesta.
Vomitiones.
Lipothymiæ.
Fluxus alvi.
Sudor profusus.

Cleghorn, Diseases of Minorca, s. 191, 213.

Somnus turbatus.
Anxietas.
Deliria.
Virium prostratio.

Sydenham, Opera, p. 301.

Rheumatismi.
Dolores ossium osteocopi.

Percival, Essays, vol. i.

Sensus ponderis et oppressionis in ventriculo.

Guarin, Method. Med. Febr. p. 23.

Nausea.
Anxietas.
Sensus ponderis in ventriculo.
Amarities oris.
Calor auctus.
Alvi obstructio.
Crebriores alvi dejectiones nigricantes.

FRIBORG, Diss. de Usu Cort. Peruv. 1773.
Indigestio.
Vomitus.

RICHARD, Recueil d' Obs. de Med. t. ii. p. 517.
Hydrops.
Pleuritis.
Icterus.
Aphonia.

J. A. LIMPRECHT, Act. N. C. ii. obs. 129.
Tormina in ventre ineffabilia.

R. M. ETTHULLER, de Usu et Ab. Præcipit. c. iii. s. 5.
Dolores tensivi.

J. FR. BAUER, Act. N. C. iii. obs. 76.
Dolores colici atrocissimi, intolerabiles.
Alvi obstructio.
Vomitus continuus.

D. CRUGER, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 3.
Lipothymia.
Asphyxia.
Labia nigra.
Ungues nigri.
[5] Pedum paralysis.
Dolor ventris scorbuticus.

J. W. ROMBERG, ibid. Dec. III. Ann. 9, 10, obs. 109.
Hydrops.
Virium prostratio.
Appetitus prostratio.

J. F. Cartheuser, Diss. de Febr. Interm. Epid. Frft. ad V. 1749.

Vertigo.
Capitis obnubilatio.
Amblyopia.
Pectoris constrictio.
[5] Angor circa scrobiculum.
Tumor abdominis.
Tumor artuum.

J. E. Stahl, in variis scriptis.

Angustatio circa scrobiculum, maxime post pastum.
Calor et rubor volaticus in facie.
Gravitas capitis.
Desidia veternosa.
[5] Intumescentia flatuosa.
Tensio pertinax in abdomine, angorem procreans.
Hypochondriaca symptomata.
Colicæ.
Inflammationes in abdomine.
[10] Aposthemata in abdomine.
Indurationes in abdomine.
Icterus.
Tumor pedum.
Ascites.
[15] Anasarca.
Tympanites.
Synochæ cum sudore immani, exleges.
Angina.
Cardialgiæ suffocatoriæ.

Idem, Obs. Clin. p. 144, 171.

[20] In hypochondriis molestiæ.
Artuum lassitudo.
Siccitas oris.

Anxietates insignes.
Febres lentæ.
[25] Hydrops.

Formey, Med. Ephem. i. 2.

(Ab usu interno.)

Tumor erysipelaceus totius corporis.

(A dentifricio ex Cinchonâ.)

Gingivarum et labiorum tumor.

C. E. Fischer, in Hufeland's Journ. d. pr. Arnz. iv. p. 657.

Facies tumida, rubra.
Tumor pedum dolorosus, urinâ paucâ luteoviridi, turbidâ.

Idem, p. 653.

Anorexia.
Sapor amarus.
[5] Flatulentia.
Dolor in articulis manuum et pedum arthriticus.
Constipatio.
Urina turbida.
Lingua pituita flava obducta.
[10] Color cutis flavescens.
Caput obnubilatum.

De Koker.

(A semi-unciâ in sanis inter primas horas.)

Pulsus multo lentior, debilior.

Alex. Thomson, Medic. Inqu. And. Obs. iv. N. 24.

Icterus.
Hydrops.
Asthma. (Sequentes paroxysmi 5 ad 6 minuta durabant et reiterabant.)

Dolor pedis, genuum, capitis, ossis, femoris, juncturarum, quasi distortæ essent et dissecarentur per vices invalescens.

[5] Abdominis duritiei, tumoris et dolorum parvi accessus.

Asthmatis suffocatorii paroxysmi breves.

Apoplexiæ et insaniæ parvi accessus.

Post horrorem levem aphonia.

Respiratio intercepta. (Sequentes paroxysmi 25 circiter minuta durabant et reiterabant.)

[10] Respiratio cum sibilo per nares.

Abdominis et laterum constrictio, scapulis sursum deorsum tractis.

Collum obstipum in latus. (Per semi-minutum.)

Protensis brachiis incurvatio digitorum.

Debilitas chronica.

MENISPERMUM COCCULUS L.

(Seminum pulveris tinctura.†)

Vis ad minimum 36 horas durat.‡

Angor repentinus summus.

Palpitatio cordis.

Desperans animus.

Animi desponsio.

5 Lacryma.

Animus atrociter serius, tum querulus.

Morositas summa.

Mens fixa, inattentio alte cogitabundi.

Cogitationes immotæ.

10 Mens tristissimis cogitationibus immersa, offensæ hærent altâ mente repostæ.

Serius, de valetudine suâ parum solicitus, valetudinem aliorum scrupulose curat.*

Animus malefacta aliorum et prave dicta et mendacia vel minima maximi faciens, ægre ferens.*

*(Post sex horas.)

Amor laboris nullus.

Amor nullius rei, achæria.

15 Intolerantia interpellationum, strepitus.

Vis vitalis languida.

Debilitas summa.

Nisus in decubitum.

Artus quasi paralytici.

20 Artuum paralytica immobilitas, cum strictoriis doloribus quasi in ossibus.

† Summarum virium.

‡ Vires hujus remedii durant circiter novem dies.—*Ed.*

Pedum paralytica immobilitas. (Post viginti quatuor horas observatum.)

Paroxysmi astheniæ paralyticæ, cum dorsi dolore.

Hemiplegia sinistri lateris.

Vertigo per sex horas.

25 Muscæ amauroticæ oculis obversantes.

Visus hebetudo.

Infatuatio.

Stupor mentis, cum sudore frontis et manuum gelido, et abhorrescentia potus et cibi.

Obnubilatio capitis, maxime potu et cibo aucta.

30 Frigiditatis sensus sine frigiditate, in humero. (Post quatuor horas observatum.)

Frigiditas sine horrore universalis, manus lividæ. (Primis horis.)

Frigus in dorso, quasi a glacie hinc illinc illatâ, calore fornacis non delendum.

Horror vespertinus in dorso.

Manus hæc frigida, illa calida, et vice versâ. (Jam primo quadrante horæ observatum.)

35 *Stupor manuum alternatim.*

Narcosis pedum et manuum alternatim reiterans, volatica.

Crepitus, fragor juncturarum.

Rigiditas dolorosa articulationum. (Post octo horas observatum.)

Manus frigido sudore madidæ, alternatim hæc, illa.

40 Pedum (sudor) mador frigidus.

Calor et frigus corporis alternans. (Post aliquot horas observatum.)

Sudor, mador universalis languidus a minimo corporis motu. (Jam primâ horâ observatum.)

Ardor in genis, pedibus frigidissimis. (Quartâ horâ observatum.)

Calor in fronte.

45 *Intolerantia frigidi et calidi aëris.* (Ultra et citra 75 gradus Fahrenheitianios.)

Ab aëre frigido summe augentur statim symptomata, maxime capitis dolor.

Pulsus ejusdem frequentiæ, sed minimus, durus.

Tremor in dorso.

Tremor in omnibus membris.*

50 Propensio in terrorem.*

Propensio in tremorem.*

*(Primâ et sextâ horâ observatum.)

Convulsiones tremulæ capitis.

Convulsiones brachiorum cum pollicis in manum intortione.

Sopor.

55 Coma vigilans invincibilis.

Angor terribilis insomnii instar somni principium impediens.

Evigilatio crebra e somno.

Dolor ventriculi.

Somnus crebris terroribus et vigiliis interruptus.

60 (Inter somnum decubitus pronus in abdomine).

Respiratio, maxime inspiratio sibilans, stertorosa ad suffocationem usque impedita, longissima cum brevissima, interdum cessante, alternans, cum faciei tumore apoplectico.

Pressio in scrobiculo respirationem præcludens. (Circa primam horam observatum.)

Constrictio in epigastrio respirationem præcludens.

Constrictio tensiva dextri lateris pectoris respirationem coarctans. (Post semi-horam observatum.)

65 Constrictio pectoris maxime in superiori sterni parte respirationem intercipiens. (Quartâ horâ observatum.)

Oscitatio vehemens.

Oscitatio vehemens, cum fragore in tubâ Eustachii versus tympanum.

(Dolor in oculis, quasi ab arenulæ grano premente, irritante).

Dolor dilacerans, evulsorius in oculis.

70 Siccitas palpebrarum. (Non nisi inter reliquias observavi.)*

Dolor capitis, cerebrum quasi constringens vinculo.*

Dolor punctorius in temporibus.*

Dolor capitis e constringente, ardente, lacerante, fodiente, terebrante compositus.*

*(Dolores fere omnes capitis ex Cocculo magis externi quam interni esse videntur.)

Accessus crebri, aliquot minuta durantes, capitis doloris, parvi spatii, in frontis sinistri eminentia—primo doloris diri pulsatorio lancinantis, dein formicationis versus dextram ossis frontis protuberantiam tendentis, ibique exspirantis.

75 Dolor in maxillâ inferiori laceranti diruens.

Dentis cariosi elongatio, vacillatio, tumor gingivarum. (Post duodecim horas observatum.)

Pharyngis paralysis, indeglutitio œsophagea.

Pharyngis dolor, cum tumoris in linguæ radice, inter deglutitionem dolorosi, sensu.

Ardor in velo palatino.

80 Tumor parotidis.

Siccitas faucium.

Sapor cupreus in ore.

Sapor in ore ut ab inediâ longâ.

Fuga esculentorum et potulentorum.

85 Ructus.

A refrigerio vomituritio lenis, salivæ affluxum copiosum alliciens.

Vomituritiones crebræ. (Post plures horas observatum.)

Dolor pressorius in ventriculo, scrobiculo, hypochondriis aliquot horas post pastum vel noctu in lecto.

Sensus in ventriculo ut ab inediâ longâ.

90 *Cardialgia vehemens* (erodens ?).

Dolor constrictorius ventriculi.

Pressio in abdomine superiore.

Vomituritio cum cephalalgiâ et dolore intestinorum, quasi a contritione, contusione, conspirans. (Semihorâ primâ observatum.)

Dolor tractorius (strictorius) in intestinis.*

95 Tormina dilacerantia.*

*(Colicales fere omnes dolores ad vertebras lumbares concentrantur.)

Ardor in abdomine.

Diarrhœa, sedes molles. (Post semi-horam observatum.)

Egestiones parvæ, crebræ. (Post plures horas observatum.)

Urina aquea. (Post duas horas cum dimidiâ observatum.)

100 Leucorrhœa.

Lancinatus in præputii apice.

Pruritus in scroto.

Molimina herniæ. (Octavâ horâ observatum.)

Dolor lancinanti punctorius in testiculo alterutro.

105 Dolores strictorii in testiculis.

Sternutatio.

Coryza vehemens quatuor dierum.

Pituita tenax, caput laryngis obsidens et screatum urgens.

Irritatio ad tussim in supremâ laryngis parte.

110 Calor, rubor faciei cum siti.

Sitis frigidorum, maxime cerevisiæ. (A minimâ dosi jam sextâ horâ observatum.)

Lancinatus in genâ externe, in cute et in musculis.

Gravitas in nuchâ, scapulis. (Post viginti quatuor horas observatum.)

Subter ultimâ costâ verâ dextri lateris dolor immaniter pressorius, inclinatione, tussi et respiratione auctus, tactu non auctus.

115 Dolor pressorius in mediâ sterni parte, cum angore; postea lancinans in sterno dolor. (Tertiâ horâ observatum.)

Lancinatio in latere dextro. (Primâ horâ observatum.)

Lancinatio in latere sinistro. (Tertiâ horâ observatum.)

Inter motum dolor artuum quasi a confractione.

A tactu musculi artuum dolorifici. (Post nychthemerum observatum.)

120 Strictorium dolor in artubus sinistri lateris.

Dolor artuum tam internus quam tactu exasperatus. (Post nychthemerum observatum.)

Dolores in dorso dilacerantes.

Dolores in dorso fodientes.

Dolores in dorso strictorii.

125 Dolores in pedibus dilacerantes.

Dolores in pedibus fodientes.

Dolores in pedibus strictorii.

Dolor in digitis manuum dilacerans, fodiens, strictorius.

Dolor in digitis pedum exedens. (Tertiâ horâ observatum.)

130 *Inter quietem lancinatus singuli in humeri musculis et articulatione.* (Primâ horâ observatum.)

Sub axillâ dextrâ dolor pulsatorio formicans et ardor inde ad digitos pergens. (Primâ horâ observatum.)

Lancinatus in genu.

In suris tensivus dolor inter motum. (Post decem horas observatum.)

Lancinatus in scapulis a dextrâ ad sinistram.

135 In brachii radio dolor inter motum et a tactu, quasi a contortione.

Dolor in articulatione humeri et cubito et tubo ossis

intermedio ex diffringente, lacerante, lancinante compositus, inter quietem intolerabilis cum gravitatis sensu et metu brachium movendi, motu tamen ipso mitigatus. (Quintâ horâ observatum.)

Pedum tumor vespertinus.

Pedum calor, tumor, pruritus indesinens, exedens.

Dolor acutus in pedis juncturâ, inter movendum, quasi a contortione.

140 Pruritus in juncturâ pedum.

Pustulæ tuberculosæ duræ, nullo humore refertæ, rubore circumfusæ, prurientes per diem totum ardenti dolore, in artubus, in metacarpo et dorso phalangum digitorum.

Dolores lacerantes in tumoribus glandularum duris, si qui adsunt, excitat.

Dolores lancinantes et calorem in glandularum tumoribus frigidis, si qui adsunt, excitat, certe si tanguntur. (Primâ horâ observatum.)

Symptomata omnia, maxime capitis dolor augentur potu, cibo, somno, loquelâ.

145 Symptomata maxime aucta a tabaci fumo hausto.

Symptomata aucta a coffeâ.

(Sequentia octo symptomata inter vires secundi ordinis referenda esse videntur.)*

*Animus hilaris, contentus, lepidus; facetiæ, sales. (Aliquando post minimam dosin jam horâ sextâ observatum.)

*Propensio irresistibilis in cantillationem, delirii instar.

*Orgasmus partium genitalium, appetentia rei venereæ. (Aliquando post minimam dosin jam horâ sextâ observatum.)

150 *(Menorrhagia).

*Hyperæsthesia. (Post horam vigesimam quartam observatum.)

*Irritabilitas stomachi, hæc illa facile in malam partem vertit. (Post nychthemerum observavi.)

*Calor.

*Sudor.

155 (Restagnatio flatuum). (Inter reliquias vidi.)

Constipatio plurium dierum. (Inter reliquias vidi.)

OBSERVATA ALIORUM.

AMATUS LUSITANUS, Cent. 4. Curat. 79.
(A quatuor granis in adulto.)

Nausea.

Singultus.

Animi angustiæ, agon. (Hæc symptomata illico nata sunt.)

JOHN HILL, History of Mat. Med. s. 504.

Nausea.

Syncope.

RUMPH, Amboin. tom v. s. 35.

Hæmorrhagiæ.

COPAIFERA BALSAMUM L.

(Solutio Balsami in Spiritu Vini.)

Micturitio continua.

Urinæ parcum stillicidium.

Ardor in urethrâ inter mingendum.

Dolor in urethrâ pulsatorius extra mictum, orificio urethræ aperto, tumido, inflammato.

5 Dolor in urethræ orificio, quasi a vulnere.

Blennorrhagia purulenta.

Febris aliquot dies repetens; post matutinum frigus et frigiditatem, calor pomeridianus universalis, cum siti aquæ.

Diarrhœa excrementorum alborum maxime mane inter frigus, cum doloribus ventris discindentibus, truncum incurvare cogentibus, ante et inter sedes.

Diarrhœa involuntaria.

10 Uteri hæmorrhagia.

Inter motum dolor dorsi pedis, inter frigus febrile.

Ante tormina discindentia dolor strictorius in femoris ossis tubo.

OBSERVATA ALIORUM.

Fr. Wilh. Hoppe, in Valentini Hist. Simp. p. 617.

Sanguinem exagitat; febris.

Hæmorrhagiæ.

Cephalalgiæ.

Dolores et ardores ventris.

[5] Cordis palpitationes.

Hæmoptysis.

Mictus cruentus.

Murray, Apparat. Medicam. iv. p. 61.

(Largiori dosi.)

Alvum laxat.

CUPRUM VITRIOLATUM.

(Solutio in aquâ.)

Vis.†

Fastidium quadrantem horæ durans.*

Nausea quadrantem horæ durans.*

*(Statim post sumtum medicamen oriuntur.)

Pressio in scrobiculo. (Post quadrantem horæ observatum.)

Nausea vomituriens.

5 Vomitus identidem recurrens, violentus.

Mane pituitosum maxime os.

Sensus in vertice formicans, ut in narcosi obtusus, mistus cum depressionis sensu a vertice deorsum et quodam stupore. (Post quadrantem horæ observavi.)

Sensus depressorius in vertice. (Horâ unâ exactâ observatum.)

Angor.

10 Sapor dulcis in ore.

Hypochondria per respirationem dolore laceranti affecta, tactu maxime dolentia ut a contusione.

(Ex iis, quæ sequuntur, symptomatis conflatus paroxysmus ecstaticus post plures tandem horas oriri, et subinde recurrere solet: unus quisque semi-horam, horam durat, spatiis liberis inter quemque plus minus longis intercalatis.)*

*Palpitatio cordis.

*Vertigo.

*Hæmoptysis.

† Quantum temporis duret, nondum experiri mihi licuit; sed diu non durare, mihi verosimile est.

15 *Constrictio pectoris dolorifica.

*Tussis.

*Respiratio inter tussim intercepta et fere deleta.

*(Quæ sequitur series symptomatum paroxysmus est ecstaseos, qui per tempus aliquod subinde recurrere consuescit.)

*Dolor pressorius pectoris

*Lassitudo.

20 *Oculi vacillantes.

*Palpebræ statim clausæ, vibrantes.

*Sensus omnes evanidi.

*Respiratio citissima, vagitosa.

*Jactatio.

25 *Pedes frigidi.

*Singultus.

*Reminiscentia aliquando citius rediens, quam potestas palpebras diducendi et loquendi.

Tussicula respirationem intercipiens. (Post reditum reminiscentiæ.)

Tussis (primo mane orta a dosibus binis pridie datis) indesinens per semi-horam, horam, horas duas durans. (Nec interdiu rediens.)

OBSERVATA ALIORUM.

Cosmier, Wahrnehm. Med. Chirurg. Altenb. iii. p. 308.

Dolores atroces ventriculi.*

Convulsiones extremitatum.*

Ululatus quasi ranarum.*

Amentia timida aufugere conantis.*

*(Symptomata per paroxysmos recurrentia improvisos, subitaneos.

[5] Oculi prominentes, splendentes.

Tormina.

Ventriculi debilitas.

Dolores intra scapulas, in cubiti flexione, in genuflexione.

LAZERME, de Morbis Capitis, p. 253.
(A denario deglutito.)

Epileptici insultus per intervalla brevia recurrentes.

PFUNDEL, in HUFELAND'S Journ. d. pr. ii. Arz. p. 274. (A granis duobus cupri ammoniaci.)

Obtenebratio visus.

Anxietas.

Mador cutis.

Enuresis.

[5] Pulsus celerior.

Mens exaltata.

(A granis sex.)

Vomitus vehemens bilis meræ. (Post quadrantem horæ.)

Vomituritiones cum torminibus spasmodicis in abdomine.

Paroxysmi epileptici. (Ante primam horam elapsam.)

[10] Paroxysmi asthmatis; pectus angustatum, respiratio difficilis, fere ad suffocationem usque.

Post paroxysmos epilepticos et asthmaticos, vomituritiones spasmodicæ, subsequâ intermissione vix semi-horæ.

Caput tumidum.

Facies rubra.

Pulsus plenus naturalis tamen velocitatis.

[15] Lapsus virium insignis; nec artus movere, nec verbum proferre potest. (Post octavam horam perse-

quens nychthemerum hinc inde reiterantes leves spastici insultus et post singulum quasi mortua jacebat.)

Impos animi. (Postero die.)

Constipatio per septem dies.

Vomituritio.

Ardoris sensus in ventriculo.

[20] Secessus copiosus urinæ fœtidæ, viscidæ, turbidæ, sine sedimento.

Sudor nocturnus validus.

J. Horstius, ap. Schenck, lib. vii. obs. 223.
(A scobinâ ex campanâ in adultâ.)

Vomitus violentus.

Diarrhœa vehemens.

Corporis tumor.

Capitis dolores immanes.

[5] Ventriculi dolores immanes.

Vertigines.

Punctiones.

Phrenitis.

Post mentem receptam rosiones et punctorii dolores in ventriculo, quasi acubus transfixus esset.

DIGITALIS PURPUREA L.

(Succus foliorum solis calore inspissatus.)

Vis sex ad septem dies durat.†

Frigiditas primo digitorum, manuum, pedum, tum volæ et plantæ, tum totius corporis, maxime artuum.

Lapsus virium vitalium.

Palpitatio cordis.

Nisus in laborem. (Post semi-horam observatum.)

5 Mœror lacrymatorius de frustrationibus variis. (Post sesquihoram observatum.)

Mortis timor.

Mania taciturna, reluctans, inobediens; aufugere tentat.

Pulsus dimidio tardior plurium dierum.

Constrictio dolorifica pectoris suffocatoria, maxime inter experrectionem e somno, considere cogens, cum sensu quasi connatæ essent omnes partes pectoris.

10 Dolor in genubus quasi a contusione.

Juncturarum dolor acutus.

Languor dormituriens, sopor. (Post octo horas observatum.)

Borborygmi colicales per semi-horam.

Salivatio.

15 Nausea.

Vomitus.

Purgatio.

Urinæ profluvium.

Hæmoptysis.

20 Ophthalmia chemodes.

† Recentiora experimenta monstrant vires hujus medicamenti, parvâ quantitate adhibitâ, per plures dies, majore dosi per sex hebdomadas conservari posse. —*Ed.*

Inflammatio glandularum meibomianarum.

Pulsus durus, parvus, celer.

Incontinentia alvi et urinæ. (Non nisi inter reliquias observavi, dubius an primi ordinis viribus sit accensendum.)

OBSERVATA ALIORUM.

H. BOERHAAVE, Hort. L. B. p. 308.

Exulceratio oris, faucium, œsophagi, ventriculi.

BAYLIE's Practical Essays on Med. Subjects, p. 39. Lond. 1773.

Vomitus ingens. (Quatuor horarum.)

Purgatio vehemens.

Exulceratio oris interni, linguæ, gingivarum, cum salivatione. (Trium dierum.)

DON. MONRO, in Samml. b. A. f. pr. Aerzte, xiii. p. 2.

Inflammatio vesicæ colli.

LENTIN, Beob. Einig. Krankh. p. 167, 1774.

Vomitus enormis.

Constrictio gulæ spasmodica.

Singultus.

Diarrhœa vehemens.

[5] Salivatio.

Pulsus lentus.

SCHIEMAN, Diss. de Digit. Purp. Gotting. 1786.

Objecta alieno colore visa.

Salivatio.

BAKER, Medical Transact. vol. iii. p. 292.

Pulsus multo lentior, ad dimidium fere.

Lettsom, Mem. of the Medical Society, vol. ii. p. 172.

Pulsus multo lentior. (Per 24, immo 48 horas; tum vero tanto celerior, depressus tamen.)

Warren, in Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte, xi. p. 1.

Nausea quasi moribundi.

Withering, in Samml. b. Abh. f. pr. Aerzte, xi. p. 1.

Nausea agonizans per vices repetens. (Quatuor sæpe horas durans et vel ante vel post diuresin invalescens.)

Vomitus longus.

Purgatio.

Vertigo.

[5] Scotomia.

Confusio visus, color objectorum vel viridis, vel luteus.

Pulsus lentus. (Triginta quinque adeo ictibus in minuto.)

Sudor frigidus.

Spasmi.

[10] Syncope.

Murray, Appar. Medic. vol. i. p. 734.

Pruritus in glandulis.

Dolor in glandulis.

Cephalalgia.

Visus obtenebratio.

[5] Vertigo.

Inflatio faciei.

Febris.

DROSERA ROTUNDIFOLIA L.

(Foliorum pulveris tinctura.)

Vis duorum fere dierum esse videtur.

Frigus continuum, calefieri nequit.
Inter requiem et calorem justum corporis horripilatio, calefieri nequit nec in lecto.
Inter requiem horripilatio, inter motum nulla.
Membra omnia torpefacit.
5 *Raucedo, raucedo aphona.*
Caput obnubilatum, grave.
In capite dolor pressorius.
Respiratio alta.
Lancinatus et pulsatio in scrobiculo.
10 *Effluxus salivæ aqueæ copiosus.* (Citius, serius observavi.)
Amari liquoris regurgitatio.
Amari et acidi liquoris regurgitatio.
Sapor escarum deletus.
Tussis.
15 Tussis nocturna.
Vomituritio inter tussim.
Inter tussim vomitus aquæ, pituitæ, escarum.
Palpebrarum conglutinatio purulenta.
Linguæ apicis exulceratio albida.
20 Sternutatio dolorosa, et tussis, manu pectus fulcire cogens.
Pupillæ contractæ.
Hæmoptysis.
Tormina forficantia, correptoria, cum diarrhœâ.
(Tormina discindentia) (Post tres horas observatum.)
25 Tormina contortoria.

Dolor hinc inde in dorso, quasi a contusione.

Artus omnes quasi a verberatione dolorosi, vel tactu.

Rheuma motu percipiendum intra scapulas ad os sacrum usque.

Femorum musculi dolorosi, quasi caro ab ossibus separata esset.

30 Dolor regionis hypochondriacæ, tactu exasperandus, tussim reprimens, constrictorius; tunc tussis non possibilis, nisi manus scrobiculo imponatur.

Sitis.

Calor in capite.

Calor et rubor faciei. (Post quintam horam observatum.)

Sudor nocturnus.

35 Agrypnia.

Tumor parvus, rotundus in medio linguæ corpore, non dolorosus. (Non nisi inter reliquias observatum.)

OBSERVATA ALIORUM.

Haller, vel Vicat, Matière Med. i. p. 313, 314.

Cutem exulcerat.

Dentes lædit.

Bonfigli, apud Vicat, ibid.

Sudores.

Nicolaus, apud Vicat, ibid.

Diuresis.

HYOSCYAMUS NIGER L.

(Herbæ succus calore solis inspissatus.)

Vis trium et plurium dierum.

Caput obnubilatum et obtenebratio ea, quæ a nimiâ corporis debilitate in caput adscendere solet. (Maxime mane observatum.)

Ob angorem et anxietatem agrypnia.

Dolor capitis obtusus in fronte, maxime in meningibus cerebri.

Dolor capitis in fundo cerebri obtusus.

5 (Dolor lacerans in occipite).

(Dolor capitis punctorius).

Taciturnitas interna.

Coma vigilans.

Gustus et olfactus deletus.

10 Hallucinatio in visu, candelæ unius flamma minor videtur; alterius magna; quamquam candelæ sint pares. (Post decem horas observatum.)

Narcosis artuum.

Frigidi pedes.

Vertigo.

Memoria debilis.

15 Nausea.

Anorexia sapore integro.

Vomituritio.

Salivatio.

Salivæ sapor salsus.

20 Sensus mordax in faucibus.

Dentium vacillatio et sensus vibrans, tinniens, in iis.

Dentium (inter mordendum maxime) dolor quasi casuri essent.

Dentium (in gingivis) dolor lacerans, maxime ab aëre frigido.

Siccitas narium.

25 Tussicula sicca.

Accessus crebri pressionis in scrobiculo, respirationem coarctantis.

Pressio in umbilico.

Tormina discindentia.

Dolor in infimo abdomine discindens.

30 Spasmi abdominalium musculorum quasi a vivo animante intus tumultuante. (Post tres horas a vapore excitatum.)

Nisus alvum exonerandi creber.

Cacaturitio, sedes naturales.

Dolor in pedibus infimis.

Dolor tensivus in femorum medio transversus et quasi nimis curta essent inter adscensionem scalarum.

35 Dolores fixi in lumbis.

(Dolor lacerans in dorso).

Faciei calor, rubor.

Hæmorrhagia narium.

Zelotypia.

40 Rixæ.*

Furor injurians, lædens.*

Paralysis vesicæ.*

*(Inter secundi ordinis vires videntur referenda.)

Febris pomeridiana frigoris plena, dolore stipata, v. c. dorsi.*

Furunculi frequentes majores.*

45 Meticulositas summa.*

*(Non nisi inter reliquias vidi.)

OBSERVATA ALIORUM.

EL. CAMERARIUS, Acta Nat. Cur. tom. i. obs. 121. (A radicibus in puero 6 annorum.)

Prosternitur in terram subito.
Convulsus alternis quassat pedibus terram.
Jactationes corporis enormes.
Spasmis artus flectuntur et trunco flexo corpus in altum projicitur.
[5] Spuma ante os.
Oculi torvi tortique.
Facies distorta, livida, lurida, ore hiante.
Præcordiorum coarctatio.
Respiratio difficilis, ronchis reciprocis.

CHPH. SELIGER, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 1, obs. 138.

(A fotu capitis per decoctum Hyoscyami.)

Epilepsia.

G. W. WEDEL, Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 3, obs. 21.

Coma vigil.
Inagnitio adstantium.
Faciei rubor.
Delirium.
[5] Stupiditas.
Verba non cohærentia.
Anxietas ingens.

J. B. HELMONT, Jus Duumvir. § 22.

Dementia totalis.

J. la SERRE, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 5, obs. 78. (In clystere.)

Temulentia.
Omnibus sensibus orbatus.
Torvus adspectus.
Sedet in lecto immobilis, statuæ instar.

G. CLAUDER, Misc. Nat. Cur. Dec. V. Ann. 6, obs. 178. (Ab externo usu.)

Tumor.
Stupor dolorificus manuum.

J. A. HUNERWOLF, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 2, obs. 92. (A radice.)

Stupida obmutuit.*
Torvo vultu obvios intuetur.*
Excœcata et amens passim errat per urbem.*
Vomitus.*
*(Fœmina.)
[5] Somnus trium dierum.*
Constrictio faucium.*
Caligant oculi.*
Motus convulsivi.*
Delirium.*
[10] Diarrhœa.
Somnus immodicus.*
*(Filius 13 annorum.)
Pectoris angustia.*
Vertigo.*
Prostratio humi.*
[15] Delirium.*
Oculi inversi.*
Intra pugnum inprimit pollices.*
Vomitus.*
Somnus altus.*
*(Puella 8 annorum.)

[20] **Anxietas.***
Lipothymia.*
Riget tota veluti tetano.*
Desipientia.*
Vomitus.*
***(Puella 6 annorum.)**
[25] **Somnus duorum dierum.***
Nausea.*
Difficilis respiratio.*
Stupor in verbis et factis obvius.*
***(Mater, quæ parum gustaverat.)**

M. Grunewald, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 9, 10, App. p. 179. (A fumo seminum.)
Contumeliæ, rixæ, tumultus.
Violentia, verbera.
Scotomia.
Vomitus crebri.
[5] Ridiculi gestus, ebriorum more.
Vertigines. (Per quatuordecim dies.)
Sedes crebriores.
Absurdæ gesticulationes, morionis instar saltantis.
Cantilenæ amatoriæ, profanæ.
[10] Versificationes.
Vagabunda insania per varias terras, nudo corpore, per æstatem pelle vestito.
(A clystere ex foliis H. ibid. p. 181.)
Effutiunt plurima, quæ per totam vitam reticuisse prudentia suasisset.
(In sacerdote a foliolo H. per clysterem.)†
Ferociæ intermista facta inepte solemnia, vestitu inconcinno. (Stolâ sacerdotali supra indusium indutus et tibialibus pellitis amictus templum adire, ibique concionari et mystica tractare intendit, et

† Octodecim horas hæc mania durabat.

furibundus aggreditur eos, qui eum retinere conantur.)

Hallucinatio circa magnitudinem rerum. (Alaudam pro ansere venditabat.)

[15] Temulentia.

Vomitus.

Altercatio.

Illatio manuum violentarum.

Gesticulatio.

[20] Inepte facta.

S. Schulze, Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 4, 5, obs. 124. (A radice.)

Jurgia.

Verbera, furor. (Obvios trucidare gestiebat.)

Gesticulationes histrionum instar.

Hallucinatio circa formam et faciem rerum obviarum. (Alter omnia ex auro confecta putat, alter homines obvios porcos esse credebat.)

Arch. Hamilton, in Neue Edinb. Vers. II. p. 275. (A seminibus Hyosc. Albi.)

Torpor. (Post semi-horam.)

Somnolentia, palpebras aperiendi impotentia.

Animus demissus, tristitia.

Lassitudo et languor totius corporis.

[5] Propensio in somnum incoercibilis. (Quæ manu tenet, labi patitur.)

Faucium immeabilitas insignis et siccitas, ita ut sorbitio theæ potus ipsum suffocatura esse videretur.

Tormina.

Post potum modo convulsiones, modo inagnitio adstantium.

Blateratio absurdorum.

[10] Querelæ de veneficio sibi illato.

Oculi aperti, hinc illinc distorti.

Pavoris concussiones cum tremore et convulsionibus alternantes.

Floccilegium, tentat manu lectum, caput, faciem, nasum.

Pulsus minimus, debilis.

[15] Subsultus tendinum.

Tactus sensus abolitus; vellicationem non ægre ferebat.

Excretio alvi suppressa.

Indeglutitio; liquores ori ingestos statim exspuebat bis.

Agrypnia nocturna convulsionibus et concussionibus, quasi a terrore, intermista.

[20] Captat temere circumcirca.

Pulsus fortior. (Post quatuordecim circiter horas.)

Mens redux, oculis tamen torpidis et cerebro obtenebrato. (Post viginti sex circiter horas.)

Pulsus celer, fortis.

Querelæ de gravitate et dolore insigni capitis.

[25] Sudor copiosus.

Somnus.

C. M. Blom, Kon. Vetensk. Acad. Handl. 1774, p. 52. (A duabus radicibus comestis in adulto.)

Ardor ventriculi.

Sitis intolerabilis.

Pervigilia.

Vertigo.

[5] Insania.

Visus imminutio.

Macularum et vesicularum gangrænosarum copiosa eruptio, maxime in artubus inferioribus.*

Diarrhœa.*

*(Post nychthemerum.)

NAVIER, Recueil Period. d'Obs de Med. tom. iv.

Narcosis extremitatum.
Debilitas.
Vertigo.
Syncope iterata.
[5] Chemosis.

PLANCHON, Journ. de Médecine, tom. xix. p. 42. (A semine.)

Vertigines.
Cephalalgia continua, atrox.
Agrypnia diuturna.
Insomnia terrifica.
[5] Phantasmata millia animo obversantia.
Motus convulsivi leves extremitatum, modo superiorum, modo inferiorum.
Anorexia.
Languor.
Oculi convulsionibus agitati, prominentes. (Post quatuor hebdomadas.)
[10] Collum sinistrorsum incurvatum.
Epileptici parvi insultus intermisti apoplecticis accessibus.
Sudores magni.

COSTA, Journ. de Medic. tom. xxx. Febr.

Ardor per totum corpus internum. (Statim initio.)
Caput grave, obnubilatum.
Facies livida. (Post duas horas.)
Venæ inflatæ totius corporis.
[5] Oculi rubri, splendentes.*
Saltatio.*
Furor incoercibilis.*
Floccilegium cum mussitatione.*
*(Paroxysmi invicem alternantes.)

Apoplexia stertorosa.*

[10] Convulsiones.*

*(Paroxysmi invicem alternantes.)

Pulsus parvus, citus, intermittens.

Lingua sicca, munda.

Hypogastrium inflatum; tactu dolorosum.

Suppressio urinæ.

[15] Pruritus, scalpere ad sanguinolentiam usque cogens.

Horror potulentorum.

Circulatio sanguinis aucta. (Post duodecim horas.)

Sudor universalis, maxime femorum et crurum. (Post nychthemerum, per duos dies durans.)

Eruptio cutanea (post 72 horas) a zonâ ad genu usque pustularum magnarum coacervatarum (variolarum confluentium instar) nullo humore repletarum, post quatuor dies squamis deciduarum.

[20] Myopia quatuor dierum.

KIERNANDER, Utkast til Medicinal Lagfar. 1776, p. 267.

(A radice in duobus adultis.)

Sopor diuturnus.

Fatuitas, vesania.

Mussitatio, blateratio in semet versa.

Furor atrox, obvios cultro adgreditur.

GARDANE, Gazette de Santé, 1773, 1774, p. 294.

(A vapore herbæ.)

Vomitus.

Hæmorrhagia narium.

Obnubilatio, stupor.

Cephalalgia plurium horarum.

HAMBERGER, Diss. de Opio, § 18.

(In puero a radice Hyosc. comestâ.)

Inquietudo.*

Masticatio impedita.*

Indeglutitio.*

(Post sesquihoram.)

Molestia in faucibus; digitis monstrat, ac si quid in ore hæreret.

[5] Potum desiderat, nec tamen deglutire valet.

Dormituritio. (Post duas horas.)

Ex somno sponte excitatur cum clamore.

Standi, sedendi impotentia.

Natium et pedum rubor.

[10] Ardor externus totius corporis sine rubore.

Cutis totius corporis inflammata, rubicunda cinnabarini coloris. (Brevi post solum ardorem.)

Inter clamorem, et ardorem constantem, respiratio vehemens (gravis) et manuum violenta agitatio. (Hic status ad octavam usque horam durabat.)

Tranquillus decubitus. (Per duas horas cum semisse durabat, morte subsequente.)

Facies pallida, frigida.

H. SLOANE, Philos. Transact. No. 457.

(A seminibus in infantibus.)

Sitis indelebilis.

Vertigo.

Scotomia.

Furor.

[5] Somnus longus, profundus.

I. STEDMAN, Philos. Transact. vol. xlvii. p. 194.

(Ab herbâ in decocto, in septem hominibus.)

Vertigo ingens.

Ebrietas.

Stupor.

Vacillatio. (Duorum nychthemerorum.)

[5] Amentia. (Post tres horas.)

Inagnitio necessariorum.

Blateratio inconcinna.

Delirium quasi synochi.

Pulsus debilis, abnormis.

[10] Salivatio.

Mutatio coloris faciei crebra.

Oculi splendidi.

Captabant obvia, casura enim fore clamantes.

Imbecillitas pedum.

[15] Sudor magnus.

Enuresis.

Inquietudo summa.

Mania; vix contineri potest.

Ventriculi imbecillitas.

[20] Pressio in ventriculo.

Tormina.

Lancinatus in pectoris latere.

Cephalalgia.

Rigescentia manuum.

[25] Tumor manuum.

A. Stoerck, lib. de Stram. Hyos. Acon. Vien. 1762, p. 36, 39, 47, 55.

Frigus et horror per totum corpus. (Circa semihoram.)

Anxietates.

Mador subfrigidus.

Visus debilitas.

[5] Animi deliquii accessus.

Dolor colicus.

Diarrhœa pituitosa, debilitans.

Alvus tardior.

TARG. TOPPETTI, Relaz. di Alcuni Viaggi, vol. vi. p. 279.

Impotentia deglutiendi.
Aphonia.
Amentia.

GREDING, in LUDWIGII Advers. Med. Pract. vol. i. p. i. p. 113, 116.

(A granis extracti per diem tribus ad octodecim.)

Sudor copiosus.
Somnus placidus, profundus.
Animi serenitas, corporis vigor.
Capitis obnubilatio.
[5] Capitis gravitas.
Cephalalgia.
Vertigo.
Sensuum internorum torpor.
Exanthemata fusca, serpinginosa, pustulosa in mento et genâ.
[10] Furunculi.
Tumor parotidis sinistræ.
Urinæ copiosum profluvium.
Alvi dejectiones crebræ.
Nausea. (Raro.)
[15] Vomitus.
Ventris tormina.
Borborygmi.
Alvus adstrictior per breve tempus. (Raro.)
Menstrua.
[20] Menstruum irregulare.
Ptyalismus.*
Muci narium copiosior excretio*
*(Raro.)
Dolores rheumatici.
Tussis sicca convulsiva.

[25] Tussis phthisica.
Singultus.
Languor totius corporis.

J. G. Gmelin, Reise d. Siberien. Gott. 1752, vol. iii. p. 84, 85. (Ab hyoscyamo physalode.)

Ebrietas.
Hallucinatio circa magnitudinem rerum. (Culmum paleæ pro trabe et guttulam pro oceano habentis.)
Terribilis phantasia de morte præsentaneâ.

Matthiolus, Comment in Diosc. lib. vi. p. 1064.

Capitis gravitas.
Venarum distentio.
Mentis alienatio, cum quâdam verborum altercatione.
Mania quasi a cacodæmone obsessi.

Barrere, Observ. d'Anatomie, 1753.

Hydrophobia.
Ventriculi inflammatio.
Hydrops pertinax.

Wepfer, Hist. Cicutæ Aquat. Bas. 1716, p. 230. (A radice in acetario.)

Vertigo.
Ardor, siccitas linguæ, labiorum, corii adusti instar.
Fauces horridæ.
Tormina.
[5] Dolores in artubus.
Lapsus virium insignis. (Post quatuor circiter horas.)
Amentia.
Delirium, hallucinatio nuces diffringere opinantis, quarum nucleos avibus projiceret, et manibus abigentis veluti pavones.

Mussitatio ineptorum.

[10] Hallucinatio fornacem amplectentis loco arboris scandendæ.

Clamores de torminibus quasi ilea rumpantur, pugnis in latera innixis.

Impotentia palpebras aperiendi.

Scotomia.

Inter legendum, verborum et phrasium inconcinna admistio.

[15] Visus depravatus literas, formicarum discurrentium instar, animatas opinantis.

Hallucinatio amblyopica acum loco incongruo figentis.

Presbyopia chronica.

HALLER, in VICAT, Matière Med. i. p. 184.

(A seminibus.)

Amentia.

Hemiplegia.

VICAT, Mat. Med. i. p. 185.

(A pulvere seminum naribus attracto.)

Vertigines.

Capitis gravitas.

J. JASKIEWITZ, Diss. Pharmaca Regni Veget. Vindob. 1775, p. 53. (A seminibus in puellâ.)

Convulsiones. (Quinque dies durantes.)

(In adulto—In ipso Van SWIETEN.)

Visus obtenebratio.

Memoriæ lapsus.

Spasmi.

[5] Aphonia.

Van EEMS, in Prælect. Boerhaavii Dem. n. ad tom. i. p. 236.
(A vapore succi—In ipso BOERHAAVIO.)
Sensuum amissionis periculum.

De RUEF, Nov. Act. Nat. Cur. tom. iv. obs. 59.
(A fumo seminum.)
Virilis impotentia. (Per duos menses.)

J. FABER, ap. SCHENCK, lib. vii. obs. 151.
(A viginti quinque seminibus in viro.)
Mentis alienatio summa.
Inagnitio parentum.
Lipothymia mortui instar.

WENDT, in HUFELAND'S Journ. b. pr. Arz. v. p. 360.
Objectorum color rutilus visus.*
Oblivio omnium.*
*(Per 36 horas.)
Punctiones ex digitorum apicibus et omnibus corporis partibus micantes. (Post pauca minuta.)
Stupor mentis totalis. (Per 12 horas.)

BERNIGAU, in GUFEL. Journ. d. pr. Arz. v. p. 905.
Myopia vix trium passuum.
Scotomia, quasi velamen ante oculos.
Facies rubra, tumida.
Vox impedita.
[5] Delirium.
Fauces siccæ.
Fauces constrictæ, deglutitio impedita.
Debilitas, vix pedibus insistere potest.
Vertigo, labi continuo visus. (Symptomata 36 horas durabant.)

IGNATIA AMARA L.

(Seminis pulveris tinctura.)

Vis octo ad viginti usque horas durat.†

Frigus maxime in pedibus.

Frigiditas pedum et tibiarum supra genu usque.

Frigiditas et frigescentia (sive horror quasi ex metu frigoris) pupillis parum dilatabilibus.

Formicatio in pedibus.

5 ***Formicatio narcotica in artubus.*** (Aliquando quartâ horâ observatum.)

Pupillas initio contrahit.

Vertiginis species, sensus titubationis hinc inde.

Angor brevis durationis. (Post quadrantem horæ observatum.)

Fuga laboris, motus.*

10 Fuga loquelæ, taciturnitas.*

*(A primâ ad quartam usque horam observatum.)

Angor summus vocem impedit.

Submissa vox, impotentia clarâ voce loquendi.

Immobilitas quasi paralytica artuum inferiorum, cum vulsionibus singulis.

Pedum infirmitas.

15 Lassitudo brachiorum, pedum.

Debilitas ad geniculationem usque.

Vacillatio, casus, ad minimum offendiculum impingit et prolabitur.

† Ignatia vires ejus novem dies interdum retinet.—*Ed.*

Coma; piget, oculos ad videndum, os ad loquendum aperire, cum respiratione leni et lentâ.

Capitis sensus quasi a vacuo.

20 *Caput grave.* (Etiam quartâ et sextâ horâ observatum.)

Caput propendulum.

Caput mensâ suffultum.

Gravitas capitis, quasi sanguine nimis turgeret (qualis vulgo fit per pronationem altam capitis) cum dolore lacerante in occipite qui mitior fit inter decubitum in dorso, exasperatus erectione trunci, maxime vero pacatus altâ pronatione capitis inter sessum.

Pressorius dolor in fronte supra nasi radicem, caput deprimere cogens, tumque vomituritio. (Horâ quintâ vidi, sed tamen ad primi ordinis vires referendum videtur, forsan secundi vel tertii paroxysmi initium.)

25 *Caput sanguine quasi turgidum, narium internarum sensibilitas erga aërem ut in epistaxi instante usu venit.*

Capitis dolor pulsatorius.

Capitis dolor tempora quasi distendens.

Pressio in temporibus, interdum cum somno profundo.

Capitis dolor pulsu arteriarum auctus.

30 Capitis dolor loquelâ auctus.

Manuum calor cum horrore corporis et anxietate ploratum gignente.

Calor ardens pedum.

Ardor in ulcere.

Querelæ immodicæ ejulatoriæ ob minima. (Horâ primâ observatum.)

35 Timiditas, diffidentia sui, omnia perdita putantis.

Angor, quasi crimen commisisset.

Punctus innumeri (maxime in lecto) quasi a pulicum ictibus.

Pruritus in scroto quasi a pulicibus innumerabilibus.

Lancinatio in cordis regione in exspiratione. (Statim post haustam Ignatiam observavi.)

40 Lancinatus, postea punctus in scrobiculo. (Circa quadrantem horæ observatum.)

Punctus in latere sinistro. (Post semi-horam, sed et post tertiam horam observatum.)

Punctus in genâ.

Punctus in ventriculo. (Horâ unâ exactâ observatum.)

Punctus in nuchâ.

45 Lancinatio in labiis, maxime dum moventur. (Post quadrantem horæ observatum.)

Labia fissa sanguiniflua.

Lancinatio in velo palatino ad aurem internam usque. (Post sesquihoram observatum.)

Pressorius dolor sinistri pectoris, et hoc evanido

Punctorius dolor dextri pectoris. (Circa horam primam observatum.)

50 Cum angustiâ pectoris, pressio in scrobiculo, inspiratione auctâ et in lancinationem in scrobiculo cito transiens. (Secundâ horâ observatum.)

Pressio in collo.

Pressio in scrobiculo.

Constrictorius dolor, torminum instar, a latere utroque, sub costis ultimis. (Post quadrantem horæ observatum.)

Pressorius dolor in utrâque parte epigastrii, seu hypochondriorum.

55 Constrictorio pressorius dolor in utero, dolorum ad partum instar, immanis, subsequente blennorrhagiâ purulentâ, erodente.

Pressorius dolor in grandulis submaxillaribus.

Spasmus tonicus membrorum omnium, quasi a rigiditate.

Rigiditas genu et lumborum, inter motum dolorifica.

Tensionis sensus in cruribus supra genu usque, cum *gravitate crurum.*

60 Tormina (infra umbilicum) punctoria. (A primâ ad secundam horam observatum.)

Tormina forficantia (post punctoria) in alterutro latero abdominis. (Post secundam et circa decimam horam observavi.)

Tormina forficantia. (Aliquando circa primam horam observavi, et tamen plura suadent, ut inter secundi ordinis vires ponere malim.)

Tormina forficantia in ipsâ umbilici regione vomitum procreantia, dolore postea in pectoris sinistri latus migrante forficanti punctoria.

Dolor punctorio lacerans in nuchâ. (Circa secundam et dimidiam horam observavi.)

65 Dolor lacerans in larynge, deglutitione, respiratione et tussi auctus. (Circa sesquihoram observatum.)

Dolor strictorius in glandulis submaxillaribus. (Circa quartam horam observatum.)

Dolor strictorius a glandulis maxillaribus in maxillas tendens, tum glandularum istarum tumor. (Aliquanto serius observatum.)

In gulâ quasi ab epistomio sensus, extra deglutitionem percipiendus.

Tumor dolorosus ostii ductuum salivalium. (Circa quartam horam observatum.)

70 Salivæ sputum crebrum.

Vomituritio inanis.

Anorexia. (A primâ ad septimam usque horam mutatum vidi amarum saporem et tamen utri prioritas competat, nondum satis mihi liquet.)

Signa digestionis impeditæ, debilis.

Regurgitatio ingestorum.

75 Sapor in ore ut a corruptione ventriculi contentorum.

Sapor ingestorum, maxime cerevisiæ amarus, vel putridus

Regurgitatio amari liquoris.

Post cibum captum distentionis abdominis sensus.

Post pastum distentio abdominis, cum siccitate et amarore faucium, sine siti et genæ unius rubore, vesperi.

80 Sapor antea amarus in acidum mutatur, cum ructibus acidis.

Ructus acidi.

Sapor acidus salivæ in ore.*

Acidorum anorexia.*

*(Circa primam horam observatum.)

Ardor in linguâ. (Statim post potam Ignatiam.)

85 *Ardor ventriculi.* (Aliquando circa sextam horam observatum.)

(Sensus in ventriculo ut ab inediâ longâ, quasi a vacuo, cum sapore fatuo, et lassitudine omnium membrorum).

Tenesmus (sive impetus ad alvi exonerationem) in recto, non in ano. (Post sesquihoram observatum.)

(Lacerans in abdomine dolor).

Borborygmi.

90 Lacerans in digitis dolor et in carpi malleolo.

In manuum malleolo dolor lacerans mane post experrectionem e somno.

Strictorius dolor in brachiis.

Pulsatio in osse sacro. (Circa septimam horam observavi.)

Pulsatio in pectore dextro. (Sesquihorâ observavi.)

95 Palpitatio cordis.

Tremor plurium horarum.

Vulsio membrorum spasmodica uno ictu.

Vulsio artuum uno ictu, incipiente somno. (Circa tertiam horam observavi.)

Concussiones terrificæ inter somnum capiendum ob phantasias monstrosas, vel post experrectionem aliquamdiu vigentes. (More humano capiti cervicem jungere equinam, si velis.)

100 *Somnus profundus.* (Tertiâ circiter horâ observatum.)

Delirium querulans de strepitu nimio. (Secundâ horâ observatum.)

Intolerantia strepitus cum faciliori dilatabilitate pupillarum. (Sextâ circiter horâ observatum.)

Pupillæ dilatabiliores et magis dilatatæ. (Etiam quartâ circiter horâ visum.)

Tædium et stomachus brevis.

105 Morositas summa, opprobrians, vituperans.

Inconstantia, impatientia, hæsitatio (indeterminatio), rixæ.*

*Mutabilitas mira animi, in jocum jam, jam in fletum proni.**

*(Hi animi affectus intercapedine trium vel quatuor horarum reiterare solent.)

Capitis dolor pronatione auctus. (Hunc quamvis horâ jam primâ exactâ observaverim, nihil tamen obstat, quominus secundi ordinis viribus accenseam, superius dictum autem capitis dolorem pronatione pacatum viribus primi ordinis, cum constet Ignatiam operationis suæ curriculum paroxysmis pluribus, ambos virium ordines complectentibus, et intervallo aliquot horarum repetentibus, absolvere.)

Dolor capitis supra orbitam dextram ad nasi radicem pressorius et aliquantum strictorius, pronatione altâ emergens. (Decimâ sextâ horâ observatum.)

110 *Calor in capite.*

Calor internus ad caput adscendens, sine siti.

Faciei rubor vespertinus cum horrore.

Febris pomeridiana, horripilatio cum torminibus, tum debilitas et somnus cum calore corporis ardente.

Sensus quasi a sudore erupturo (caloris volatici anxii sensus). (Post sesquihoram observatum.)

115 *Caloris externi intolerabilis sensus;* tum respiratio cita.

Inter somnum inspiratio stertorosa.

Respiratio omnis generis inter somnum alternans, brevis, lenta, gravis, lenis, evanida, stertorosa.

Somnus tam levis, ut quævis exaudiantur, v. c. campanarum procul distantium sonitus.

Gena et auricula alterutra rubore suffusæ, ardentes.

120 Calor, ardor in nuchâ, vel colli alterutrâ parte.

Caloris insultus subitanei per totum corpus volatiles.

Calor externus auctus.

Calor et rubor externus, sine calore interno.

Ardor pruriens (ut a pernionibus) in calcaneo et cæteris pedum partibus. (Circa octavam horam observatum.)

125 Titillatio narium.

Excoriatio narium.

Catarrhus, gravedo.

Tussis cava, sicca inter expergiscendum e somno.

Fauces quasi excoriatæ, anginæ species. (Post semihoram observatum.)

130 Dolor in faucibus quasi ab excoriaturâ, deglutitione tantum percipiendus.

Asperitas linguæ apicis, quasi a vulnere.

Constrictio pectoris et respirationis. (Quintâ circiter horâ observatum.)

Inspiratio pondere quasi oppressa, exspiratione expedita.

Pectoris oppletio.

135 Expectoratio difficilis.

Sudor universalis.

Pupillæ et dilatabilitas expedita et contractilitas.

Diuresis aquosa.

Sedes mucosæ.

140 Oscitatio crebra, interrupta. (Intra octavam horam et decimam observatum.)

Lucis intolerabilitas. (Decimâ horâ observatum.)

Memoria labilis. (Ante octavam horam vel decimam observatum.)

Vacillatio dentium, odontalgia.

Formicatio in ossibus pedum, non narcotica. (Post decimam horam observatum.)

145 Dolor capitis quasi a contusione. (Horâ octavâ observatum.)

Dolor in vicinio scrobiculi, tactu tandem percipiendus, ut a vulnere interno.

Dolor simplex, tactu tantum excitandus, vehemens, parvo spatio circumscriptus, v. c. in costis, etc.

Dolor in articulatione humeri inter brachii retroversionem, quasi a nimio labore, sive a contusione.

Symptomata aucta a coffeæ potu et tabaci fumo.

150 ***Dolor in articulatione humeri, femoris, genuum quasi a contortione seu luxatione.*** (Octavâ horâ observatum.)

Dolor in humeri juncturâ, quasi contorta vel luxata esset. (Decimâ horâ observatum.)

Dolor in nuchâ, quando collum movetur, lacerans, quasi a distortione. (Duodecimâ horâ observatum. Isti quasi a luxatione dolores an vere secundi ordinis virium sint, non ausim pronuntiare.)

In malleolo manus sinistræ sensus paralyzans et dolor quasi a distortione.

Tinnitus aurium.

155 Agrypnia.

Pupillæ magis dilatabiles quam contractiles.*

Leucorrhœa chronica.*

*(Ambo inter reliquias observavi.)

OBSERVATA ALIORUM.

BERGIUS, Mat. Med. s. 150.

Menstruatio. (A nimiâ dosi, scrupulo.)
Vertigo.
Tremor totius corporis.
Motus convulsivi.
Sudores frigidi.
Animi deliquium.

CAMELLI, Philos. Trans. vol. xxi. No. 250.

Spasmi.
Convulsiones.
Risus involuntarius.
Angustia pectoris.
Vertigo.
Sudores frigidi.

VALENTINUS, Hist. Simpl. Reform. s. 198.

Borborygmi.

J. C. CRIMM, Eph. Nat. Cur. obs. 72.
(A drachmâ.)

Ebrietas. (Post primam horam.)
Insensibilitas totius corporis
Anxietas.
Agitatio continua.
Attonitus quasi incedit.
Sudor largior.

IPECACUANHA.

(Radicis pulvis et pulveris tinctura.)

Vis ultra 16 horas durare non videtur.

Horripilatio cum oscitatione. (Intra horam primam observatum.)

Frigoris hyperæsthesia.

Horripilatio cum ructibus.

Frigiditas.

5 Palpitatio cordis.

Palpitatio cordis fere sine angore.

(Vertigo inter eundum).

Inquietudo in abdomine. (Semi-horâ observatum.)

Sensus vacui et atoniæ in ventriculo.

10 Sapor in ore fatuus.

Adipsia.

In imâ linguæ parte et in velo palati is sensus, salivam concitans, qui ab esu marchantiæ, seu potius artemisiæ dracunculi nasci solet.

Nimia et fere dolorosa sensibilitas oris interni partium.

Mordacitas in labiis.

15 Mordacitas in linguæ margine.

Salivæ affluxus copiosus per aliquot horas.

Vomituritio, vomitus.

Punctio in gulâ. (Intra semi-horam, et circa horam primam pluries observatum.)

Dolor inter deglutitionem, quasi a tumore in pharynge; anginæ species. (Horâ primâ observatum.)

20 Sensus in pharynge quasi a siccitate nimiâ vel aspritudine eâ, quæ a deglutitione oritur; salivæ vel potus ordinarii deglutitione ad breve tempus minuitur et

fugatur; anginæ species. (Horâ ut plurimum primâ observatum.)

Somnolentia. (Ante horam primam exactam observatum.)

Somnus turbulentus, ejulatorius.

Idearum series lente progrediens.

Ineptitudo ad quævis impingens.

25 Achæria.

Fastidium omnium.

Morositas taciturna, contemtrix.

Morositas omnia vilipendentis et optantis ut et alii omnia flocci faciant.

Morositas infelicem se putantis.

30 *Impatientia summa.*

Ægritudo ob labores et negotia nimis lente succedentia.

Stomachatio ob strepitum minimum.

Propensio in indignationem et stomachationem summa.

(Lancinantes hinc inde dolores, motu excitati et in ardentes dolores terminati).

35 Lancinatio in hypochondrio sinistro. (Semi-horâ observatum.)

Lancinatio in ano.

Punctorius dolor in fronte, tactu exasperandus, excitandus.

*Dolor osteocopus omnium ossium (juncturarum) quasi a contusione.**

*Dolor articulationum, qualis in artuum narcosi juncturis usu venit.**

*(Tertiâ circiter horâ observatum.)

40 Tensionis et expansionis summæ abdominis sensus.

Colica flatulenta.

Tormina forficantia in utroque hypochondrio, epigastrio. (Tertiâ horâ observatum.)

Tormina discindentia circa umbilicum, una cum horrore.

Lacerans dolor in fronte, tactu exasperandus, excitandus.

45 Forficantes dolores in pede dextro.*

Forficantes dolores in brachio dextro.*

*(Intra tertiam et quartam horam observatum.)

(Forficantes (vulsorio lacerantes?) dolores, volatici in pectore sinistro sub axillâ).

Asthma.

Cephalalgia quasi a contusione cerebri et cranii, per omnia capitis ossa ad linguæ radicem usque pertingens, nauseabunda.

50 (Cephalalgia pressoria).

(Cephalalgia tensiva).

Urina rubra, pauca.

(Calor internus cum frigiditate externâ).

Stridulatio bronchiorum in respiratione.

55 *Tussis ex sensu constrictorio titillante in superiori laryngis parte* ad imam bronchiorum sedem tendente, nascens. (Circa quartam, sextam et septimam horam observatum.)

Tussis suffocatoria.

Fragor juncturarum.

Dolor genu quasi in ligamentis defatigatione confectis.

Pupillæ dilatabiliores.

60 (Sedes porraceo virides).

(Sedes citrinæ).

Siccitas palpebrarum cum somnolentiâ. (Horâ octavâ observatum.)

Capitis dolor volatice punctorius, lancinans post horam in pressorium transiens. (Horâ circiter octavâ observatum.)

Animus desideriis et votis ignotis agitatus, scrupulosus, curiosus, plenus solicitudine. (Intra sextam et octavam horam observatum.)

65 Pupillæ maxime dilatabiles. (Octavâ horâ observatum.)

Siccitas palpebrarum cum somnolentiâ. (Octavâ horâ observatum.)

Lassitudo crurum et artuum inferiorum. (Intra octavam et decimam horam observatum.)

Dolor dentium evulsorius per intervalla. (Intra octavam et decimam horam observatum. An justa observatio?)

Sensus contorquens, strictorius in testiculis. (Horâ circiter octavâ vel decimâ observatum.)

70 Calor externus sine calore interno. (Inter reliquias observavi.)

OBSERVATA ALIORUM.

Scott, Med. and Phil. Comment. vol. iv. p. 75.
(A pulveris vapore.)

Asthma convulsivum. (In fœminis duabus observatum.)

Murray, Med. Pract. Biblioth. tom. iii. p. 237.

Asthma.

Epistaxis.

Hæmoptysis.

Geoffroy, Traité de la Mat. Med. ii. p. 157.
(A pulvere volitante.)

Oculorum inflammatio.

Hæmorrhagia narium.

Angina.

Respirandi difficultas.

[5] Hæmoptysis.

Murray, Appar. Medicam. i. p. 806.

Emesis. (Post quadrantem horæ vel semi-horam.)

Purgatio.

Hilary et Cleghorn, apud eund. ibid. p. 813.

Sudor sæpe noctu sequenti.

Clarck, apud eund. ibid. p. 814.

Vomituritio ingens.

LEDUM PALUSTRE L.†

(Foliorum pulveris tinctura.)

Vis ad sex dies extendi videtur.‡

Frigiditas universalis et frigus.
Frigiditas corporis matutina sine frigore.
Frigus quasi ab aquâ frigidâ corpore hinc inde affusâ.
Horror et frigus 48 horarum cum cute anserinâ, sine frigiditate externâ.
5 Ebrietas, temulentia, vappiditas capitis.
Dilatatio pupillæ maxima.
Agrypnia cum inquietudine et jactatione.
Cephalæa quasi ab ictu.
Cephalæa sæviens ferox.
10 Cephalæa stuporifica.
Lipothymia.
Constrictio pectoris asthmatica, motu, itione exasperata.
Respiratio angusta, dolorosa.
Inspiratio convulsiva, dicrota.
15 Dolor in sterno.
Angina punctoria.
Asthma bronchiale.
In bronchii formicatio, tum respiratio cita, angusta.
Aspritudo rauca in bronchiis.
20 Tussis mere nocturna, matutina cum expectoratione purulentâ.

† Ledi effecta plura coram observare mihi non licuit, inde dubium tempus symptomatum et ordo eorum dubius.

‡ Experimenta recentiora monstrant vires hujus remedii, magnâ quantitate adhibitâ, ad quatuor fere hebdomadas retineri posse.—*Ed.*

In pectore dolor quasi a vivo animali intus tumultuante inter respirationem.

Susurrus in auribus quasi a campanis vel vento procelloso.

Lippitudo sine albuginæ inflammatione (lacrymis mordaci dolore palpebram inferiorem et genam erodentibus).

Palpebræ purulentæ, sine dolore.

25 Palpebræ purulentæ sine tumore, vel inflammatione.

Narcosis artuum.

Fragor genuum.

Morositas.

Appetitus prostratus.

30 *Salivæ aqueæ effluxus ex ore cum colicâ.*

Pruritus cutaneus.

Pruritus articulorum malleoli, pedum, lumbi.

Miliares prurientes in carpo.

Pruritus in pectore ut a pediculis, cum maculis rubris, pustulis miliaribus et tuberculis in fronte ut in bubonibus.

35 Furunculi in fronte.

Pruritus punctorius, volaticus supra totum corpus in cute.

Dolor lancinans, punctorius in manu.

Dolor lancinans in malleolo pedis.

Humerus sublatione brachii maxime dolorificus, dolore lancinante.

40 Dolor in metatarso pedis quasi a luxatione.

Diuresis.

(Sequentes vires secundi ordinis esse videntur; nec tamen certo contendam.)

Tormina strictoria.

Tormina quasi a dysenteriâ.

Tormina quasi ab intestinis contritis et debilitate eâ, quæ post purgantia remanet. (Sextâ horâ observatum.)

45 Tormina quasi a diarrhœâ nascitura ab umbilico ad anum usque, anorexia sapore integro, pedibus frigidis.

Tormina (discindentia?) cum hæmorrhagiâ ex ano.

(In latere sinistro abdominis sensus quasi a tumore pressorio ex ventriculo cibis onusto).

Dorsi et scapularum rigiditas dolorosa inter motum.

Dolores volatici lacerantes rheumatici, maxime per motum.

50 Suræ dolor tensivus post sessum inter eundum.

Genuum tumor et dolor tensivus et lancinans inter eundum.

Genu rigiditas.

Dolor tensivus genuum et calcis post sessum inter eundum.

Rigiditas crurum matutina, dolorosa.

55 Dolorosa lumborum et dorsi rigiditas post sessum.

Lumbago post sessum.

Dolores osteocopi, gravativi, stuporifici artuum. (Vigesimâ circiter horâ observatum.)

Dolor lacerans in brachiis. (Jam tertiâ horâ observatum; an ob latentem morbi jam præsentis labem tam cito natum sit symptoma, ambigo.)

Dolor lancinanti lacerans in articulationibus.

60 Artus et totum corpus tactu dolorifica, quasi contusa essent.

Dolor in osse sacro lacerans ad occiput, hemicranium et maxillam sinistram usque pertingens, maxime vesperi; tum genæ tumidæ ardentes et oculi rubri inflammati.

Plantæ incessu dolorosæ quasi ab aposthemate vel sigillatione.

Pila pollicis mollis, tumida incessu dolorosa.

Tophi et nodi in articulationibus dolentes, duri.

65 Intolerabilitas lecti caloris.

Stragulorum intolerantia ob calorem inde natum.

Sudor cum stragulorum intolerantiâ.

Calor pedum et manuum vesperi.

Sudor plantarum et volarum diutinus, calidus.

70 *Tumor pedum pertinax.*

Calor universalis sine siti.

Hæmoptysis valida cum tussi vehementi.

Hæmoptysis sanguinis dilute rubri, cum tussi vehementi.

Dolor lacerans in capite et oculo, conjunctiva et albuginea chemotica, summe inflammata, tumida, dolor lacerans in oculis, decubitu exasperatus, sessu levatus, oculis mane pure conglutinatis, sero effluo fœtente (palpebris integris) siti aquæ nocturnâ, horripilatione vespertinâ, calore subsequo; borborygmis, appetitu integro, capitis interno magis quam externo calore, sudore dorsi et capillitii. (Post vigesimam quartam horam observatum).

75 (Anima fœtida).

OBSERVATA ALIORUM.

Linneus, Flor. Lappon. p. 121.

Temulentia affræna.

Cephalalgia dira.

Pallas, Flor. Ross. tom. i. p. 2, p. 94.

Cephalæa.

Nauseæ.

Dementia.

HELLEBORUS NIGER† L.

(Pulveris radicis tinctura.)

Vis duorum fere dierum esse solet.‡

Angor summus.
Frigiditas maxime mane.
Frigus in abdomine.
Asthenia subitanea omnium muscolorum; collabitur extemplo in terram frigidus, madore frontis frigido, voce hærente, pulsu quam lentissimo, pupilla contractissima (ratione superstite?) (Post horam observatum. Syncopes aliqua, sed non vulgaris, videtur esse species.)
5 Lassitudo femorum.
Pulsus lentus. (Horâ primâ et decimâ sextâ observavi.)
Nostalgia. (Semel sed indubie observavi. Nostalgia species, angor summus genus esse videtur.)
Desperatio vitæ.
(Indeterminatio).
10 (Inconcinnus vestitus).
Tussicula.
Cephalalgia a nuchâ ad verticem confluens.
Dolor capitis penetrans (inter erectionem trunci ardor in cerebro).
Rigiditas nuchæ rheumatica.
15 Sensus in parte tumidâ quasi ab expansione et onere.
(Dolores lancinanti fodientes in integumentis ossium).
Leucophlegmatia subitanea.

† Planta a me ipso collecta.
‡ Hoc remedium vires ejus per plures hebdomadas interdum retinet.—*Ed.*

Parvi tumores in cute frontis, dolorifici quasi ab ictu.
Dolor constrictorius in osse sacro.
20 Dolor glandularum colli.
Salivatio.
Rugitus ventris.
Tormina.
Vicissitudines crebræ volaticæ caloris universalis sicci tum et horroris frigiditatis, torminibus latenter forficantibus subsequis.
25 Sedes pituitæ meræ, tenacis, albæ.
Vomituritio. (Aliquando quadragesimâ horâ observavi.)
Menstruatio. (Post octavam horam observatum.)
Pupilla dilatata.
Pulsus minimus.
30 Respiratio cita.
Calor, sudor. (Horâ trigesimâ sextâ observavi.)
Dolores lancinanti fodientes tam ab aurâ frigida, quam a labore, a pastu, et a potu exacerbati. (Inter reliquias tantum observatum.)

OBSERVATA ALIORUM.

GREW, Anatomy of Plants, p. 280.

Stupor linguæ.

SCOPOLI, Flor. Carn. p. 557.

Torpor artuum et insueta rigiditas.

BACHER, in Samml. f. pr. Aerzte, i. p. 3.

Tumor non ingratus in linguâ.

BUCHNER, Diss. de Salut. et Nox. Elleb. Nigri Usu, p. 22.

Tormina.
Anxietas.

Sitis.
Singultus.
Animi deliquia.
Sudores frigidi.
Faucium strangulatio.
Convulsiones, spasmi.

Schulzius, Mat. Med. p. 152.

Molesta cephalalgia.
Constrictio narium quasi præfocatoria.
Stimulus ad hæmorrhoides.
Febris.

Hildanus, Op. Med. Chir. Cent. 4, obs. 12.

Convulsiones.
Sternutatio.

Tournefort, Voyage du Levant, tom. ii. p. 189.

Spasmi.
Motus convulsivi.

Bisset, Essay on the Med. Const. of Great Britain, p. 333. (Ab Helleboro fœtido.)

Anxietas dira, vomitu mox cessans.

John Cook, in Oxford Magazine for March, 1769. (Ab Helleboro fœtido).

Vomitus.
Cardialgia.
Deliquia animi.
Pilorum et unguium casus.
Epidermidis desquamatio.

DAPHNE MEZEREUM.

(Pulveris corticis tinctura.)

Vis septem fere dies durat post majores doses.†

Pupillæ constrictæ.

Debilitas, languor.

Vitæ tædium et mortis desiderium, cum taciturnitate.

Nil nisi ingrata et tædiosa cogitat.

5 Vertigo syncopodes.

Horripilatio in dorso et supra brachia.

(Frigus internum).

Frigiditas externa maxima 36 *horarum cum siti magnâ, sine appetentiâ caloris, sine fugâ aëris liberi et sine calore subsequo.*

Inter frigus et frigiditatem totius corporis constrictio asthmatica pectoris anterioris et posterioris.

10 Febrile frigus cum aquosorum tantum appetentiâ.

Asthma continuum plurium horarum.

Inter altam respirationem dolor internus in pectoris latere, quasi pulmo ad costas adhæreret.

Ponderis sensus in abdomine cum anxietate.

Cum palpitatione dolor sterni pressorius.

15 *Dolor pectoris lancinans.**

*Dolor pectoris internus punctorius.**

*(Horâ quartâ observatum.)

Constrictio et quasi strictura pharyngis.

Anorexia quasi a pituitâ faucium nimiâ.

Sensus piperatus in linguâ.

20 Vesiculæ ardentes, urentes in linguâ, gingivis.

† Experimenta recentiora ostendunt vires hujus remedii per sex vel septem hebdomadas retineri posse.—*Ed.*

Aspritudo et excoriatio faucium, palati.

Raucedo ad scrobiculum colli usque pertingens.

Aspritudo et excoriatio narium.

(Aspritudo et excoriatio œsophagi).

25 Dolor lancinans in glandulis submaxillaribus.

Dolor nuchæ, in frontem tendens, lacerans.

In fronte dolor pressorio pulsatorius.

Capitis dolor pronatione trunci magnâ levatus.

Dolor capitis lancinans in vertice et fronte.

30 *Dolor osteocopus cranii et externe, maxime tactu dolorifici.*

Dolor osteocopus claviculæ lancinans.

Dolor osteocopus femorum, crurum.

Dolor (simplex)? omnium membrorum.

(Singultus convulsivus brachia et totum corpus concutiens). (Post quatuor horas semel observatum.)

35 *Palpitatio cordis.*

Coryza muci spississimi sanguinea.

Tussis sicca.

Tussis irritatione in imâ pectoris parte excitata, non cessans nisi vomituritione, et effluxu salivæ aqueæ copioso.

Tussis indesinens aliquot horarum, vehemens, emesin provocans. (Horâ primâ observatum.)

40 Casei putridi halitus ex pulmonibus.

Carnis anorexia.

Sapor cerevisiæ amarus.

Tormina lacerantia.

(Tormina doloris simplicis).

45 Dolor in abdomine pressorius, cum anxietate et æstuatione.

Sedes parvæ, molles, crebræ.

Mictus creber. (Horâ quartâ observatum.)

Urinæ ardor.

Hæmaturia.

50 **Blennorrhagia urethræ et vulvæ.**
(In urethrâ pruritus extra mictum).
Dolores tensivi in glandulis inguinis.
Frigus supra abdomen et brachia, pupillis dilatatis. (Post quintam horam observatum.)
Somnolentia diurna.
55 **Somnus inquietus, parum reficiens.**
Insomnia terribilia.
Post somnum morositas maxima.
Inter somnum successiones vehementes, ad morsuram linguæ usque.
Pruritus pertinax plurium dierum supra totum corpus.
60 **Eruptio cutanea, maxime vesperi in lecto pruriens.**
Dolor in ulcere lancinans, maxime vesperi.
Dolor in ulcere strictorius, in margine ulceris lancinans.

OBSERVATA ALIORUM.

BERGIUS, Mat. Med. p. 320.
(Ab usu interno.)

Eruptiones miliares rubræ, prurientes, brachium, caput et totum corpus occupantes, discretæ vel in plagulas confluentes, molestissimæ.

HOME, Clinical Experiments, p. 466.
(Ab usu interno corticis.)

Nausea.
Sudor.
Alvi dejectiones.

J. MAUR. HOFFMANN, Eph. Nat. Cur. Cent. 5, 6, p. 298. (A baccis quatuor.)

Hypercatharsis effræna.
Vomitus.

Oris fauciumque ardor intolerabilis.
Sitis.
[5] Febris acuta.
Cutis totius corporis desquamatio.

LINNE, Flor. Suec. p. 128.
(A duodecim granis baccarum.)

Vomitus cruentus fatalis.

Veckoskrift for Lakare, iii. p. 291.
(A baccis.)

Dolores colici vehementes.*
Diarrhœa.*
*(Per duos dies.)

LANGE, Domest. Brusv. p. 172.
(A 30 granis baccarum.)

Vomitus.
Ventriculi inflammatio.
Convulsiones. (Post 24 horas mors.)

(A nidore baccarum.)

Vertigines.
Lipothymiæ.

WEDEL, Miscell. Nat. Cur. Dec. II.
Ann. ii. p. 140.

Diarrhœa continua cum torminibus intolerabilibus.
Vomitus enormes. (Per sex hebdomadas quotidie repetentes.)

Acta Helvetica, iii. p. 331.
(A baccis.)

Ardor in linguâ ad stomachum usque.
Vomitus.
Febris ardentissima.
Virium lapsus summus.

RITTER, Nova Acta Nat. Cur. III. App. p. 234. (A baccis.)

Tormina maxime diuturna.

ENGEL, Spec. Med. b. 5. (Ab externo usu.)

Incalescentia magna corporis.
Tumor brachii.
Tumor faciei.
Abscessus supra cubiti flexuram.

HALLER in VICAT. Mat. Med. p. 353. (A 15 baccis.)

Tormina chronica. (Per mensem integrum.)

Gazette Salutaire, 1761, Dec. (A Daphnes Laureolæ cortice.)

Inflammatio gulæ, ventriculi, intestinorum.

GMELIN, Giftpflanzen, p. 562. (A scrupulo pulveris baccarum Laureolæ.)

Vomitus vehemens.
Pulsus plenus, durus, remittens.
Constipatio, abdomine molli. (Mors post novem dies.)

STRYCHNOS NUX VOMICA L.

(Seminum pulveris tinctura.)

Vis vitam periclitans 26 horis finitur, vis tota ultra tres dies extenditur.†

Ebriosa capitis obtenebratio.

Inebriatio.

Titubationis sensus in cerebro.

Vertiginis accessus, quasi cerebrum in gyrum verteretur, cum sensuum abolitione momentaneâ.

5 Vertigo cum scotomiâ.

Vertigo, sensus in cerebro hinc illinc trahens. (Sextâ horâ observatum.)

Gravitas capitis matutina, ebriosa, vertiginosa.

Capitis, dum rectum est, infatuatio, dum vero pronatur sensus in fronte quasi a pondere prolabente.

Contractio pupillæ. (Primis horis.)

10 Frigiditas maxima nec fornacis calore, nec lecti stragulis delenda.

Noctu in lecto calefieri nequit.

Frigiditas totius corporis, livor cutis. (Primâ horâ observatum.)

Calor imminutus ad frigiditatem universalem usque.

Frigus vehemens cum crepitu dentium.

15 Metus frigoris, horrescentia.

Frigus in pedibus, quasi ab aquâ frigidâ infusâ, cum tremore.

Mane horripilatio.

† Magnæ doses, secundum experimenta recentia, per quindecim, minores vero ad octo vel duodecim dies vires retinent.—*Ed.*

Per aërem liberum vel minimum refrigeratio et odontalgia punctoria, punctorio ardens.

Frigus in pedibus mane.

20 Fuga laboris, nec tamen fuga motus.*

Impedit laborem maxime literarium, nescio quid.*

*(Secundâ horâ observatum.)

Taciturnitas in semet versa, idearum progressio tarda. (Semi-horâ observatum.)

Elocutio et scriptio minus correcta retractationi obnoxia. (Inter sextam et duodecimam horam observatum.)

Loquelæ difficultas.

25 *Impatientia parvorum malorum.*

Lacrymatio ob minimas injurias perpessas.

Impatientia strepitus, confabulationum.

Meticulositas, pavor concussorius inter capitis ebriosam infatuationem.

Stomachus ingens, iracundia. (Primâ horâ observatum.)

30 Opprobria, convicia objurgationes zelotypicæ, obscœnissimis vocibus intermistæ—mox lacrymatoria ejulatio. (Tertiâ et quartâ horâ observatum.)

Jurgia in castigationem et verberationem invalescentia.

Lucis fuga.

Intolerabilitas lucis matutina, scotomica.

Nisus in decubitum.

35 Dormituritio. (Primâ horâ observatum.)

Dormituritio matutina.

Mane pandiculatio et oscitatio enormis, et post pandiculationem dolor in artubus spasticus, maxime in genu.

Lassitudo major matutina, quam dormitum ituri.

Mane nisus in decubitum.

40 *Pedum infirmitas, instabilitas.* (Secundâ horâ observatum.)

Syncope.

Deliquescentia cordis.

Genuum instabilitas.

Tremor. (Secundâ horâ observatum.)

45 Tremor pedis alterutrius et genuum.

*Visiones terrificæ.**

*Pavor.**

*(Vigesimâ horâ observatum.)

Phantasiæ nocturnæ, semivigiles, lugubres. (*v. c.* de capitibus mortuorum.)

Phantasiæ deliræ, terribiles.

50 Insomnia terribilia.

Ejulatio suspiriosa in somno.

Insomnia de laboribus diurnis sedulo perficiendis.

Cephalalgia quasi ab inanitione.

Dolor capitis in medio cerebri (pressorius ?) qualis post vomitum usu venit, depressione palpebrarum emergens.

55 Conquassationis et glocitationis sensus in cerebro inter eundum.

Ardor in cerebro subter frontem.

Capitis dolor pressorius in fronte, pronatione in mensam allevatus, in aëre libero aggravatus, cum crurum lassitudine inter adscensionem. (Tertiâ horâ observatum.)

Capitis in pronatione dolor, quasi a pondere prolabente.

Dolor capitis integumentorum, tactu exasperandus.

60 Indolorifice tractorius motus hinc inde in cerebro.

Dolor lacerans in oculis, in fronte et vertice continuus, cum nauseâ vomituriente in pectore, deliquescentiâ cordis, et infirmitate loquelæ organi. (Post duodecim et post duas horas.)

Dilacerans cephalalgia ad nasi radicem, et maxillam superiorem protensa et eundo aucta.

Strictorio lacerans dolor in capite.

Strictorius motus hinc inde in fronte ad nasi radicem.

65 Dolores tractorii (strictorii) in capite. (Sextâ horâ observatum.)

Dolor (strictorius) *tractorius primo in temporibus, tum in fronte, tum in occipite.*

Dolor capitis constrictorius.

Sensus, quasi cerebrum fissum esset. (Octavâ horâ observatum.)

Pulsationes vel ictus aliqui in capite.

70 Impotentia caput erigendi in dorso reclinati ob vertiginem et scotomiam. (Horâ vigesimâ quartâ observatum.)

Presbyopia. (An ad vires secundi ordinis referendum ?)

Ardor in oculis, sine inflammatione.

Mordax sensus ut a sale culinari in oculis.

Ardor formicans in oculis.

75 Oculi aquei, lacrymis superfusi, ut in lippitudine, vel gravedine. (Horâ primâ exactâ observatum.)

Formicatio in fronte externe.

In genâ hinc inde formicatio et rubor et calor. (Per duodecim horas.)

Genæ calidæ cum horrore interno.

Faciei caloris sensus cum horrore corporis cæteri.

80 Genæ rubræ calidæ sine siti.

Horripilatio primo, tum calor angorem creans, postea sitis cerevisiæ.

Cum frigore sitis cerevisiæ. (Aliquando horâ vigesimâ quartâ observatum.)

Anxietas ingens.

Animus pueriliter obsequiosus, tum somnus (altus), cum rubore genarum, frigore corporis et capitis interno. (Circa sextam horam observatum.)

85 Anxietas autochiriæ cupida. (Circa quintam horam observatum.)

Animus demissus, morosus.

Palpitatio cordis.

Inquietudo morosa ab inquietudine viscerum abdominalium proficiscens.

Hypochondriasis, ægritudo animi.

90 Solicitudo taciturna, in semet versa.

Inconstantia consilii.

Dilatatio pupillæ cum respiratione lentissima.

Timor mortis.

Mortem instare putat.

95 Dolor in hepatis regione.

Dolor in hepatis regione punctorius. (Post aliquot horas observatum.)

Icterus cum nauseâ ciborum et accessibus syncopes brevibus (morbosâ debilitate subsequâ).

Appetitus diminutus.

Anorexia cibi. (Statim post propinatam Nucem Vomicam observatum.)

100 Anorexia maxime panis.

Nausea panis fusci cerealis, et ab eo salivæ affluxus in ore.

Abhorrescentia a tabaci fumo consueto, coffeâ, cibo, potu.

Sapor in faucibus nauseosus, herbaceus, quasi foliorum dauci. (Post primam horam observatum.)

Sapor putridus in ore.

105 Singultus creber.

Ructus creberrimi.

Ructus post potum et pastum.

Regurgitatio amari et acidi saporis. (Circa sextam horam observatum.)

Copiosus salivæ affluxus. (Ad duodecim usque horas durans.)

110 Screatus salsæ pituitæ.

Vesiculæ in linguâ dolentes. (Sextâ horâ observatum.)

Pyrosis.

Ardor stomachi.

Ardor in œsophago ad os usque.

115 *Rasionis sensus in gulâ, qualis post sodam remanet.*

Rasio scalptoria in faucibus, inter deglutiendum cessans.

Rasionis sensus in pectore screatum provocans.

Rasio in scrobiculo.

Cardialgia lacerans.

120 Lacerans dolor in ventriculo.

Cardialgia diuturna.

Dolor ventriculi constrictorius.

Circa ventriculum obvolutio, inversio.

Constrictionis et relaxationis vicissitudines subter hypochondria.

125 *Dolor constrictorius in hypochondriis.* (Sextâ et duodecimâ horâ observatum.)

Dolor constrictorius in abdomine.

Constrictorius dolor in ventriculo.

Tensorius dolor in ventriculo.

Ascensio flatuum in abdomine et restagnatio eorum ad hypochondria.

130 Flatuum incarceratio.

Pressio aliquot uncias infra scrobiculum, ructus afferens.

Scrobiculi expansio, tactu dolorosi.

Temperatura justa corporis, sitis, et tamen potulenta ventriculum aggravant. (Sextâ et octavâ horâ observatum.)

Ventriculi pulsatio.

135 In ventriculo pressio quasi a lapide.

Ponderis sensus in abdomine.

Post pastum pressio in abdomine et scrobiculo cum meteorismo.

Borborygmi matutini, sonori.

Borborygmi pomeridiani.

140 Forficanti lacerans dolor in abdomine ad pectus tendens. (Primâ horâ observatum.)

Sensus (non dolor) tractorius ab extremitatibus inferioribus ad umbilicum usque, et tum in umbilico convolutio, seu depsatio.

Paroxysmus spasmo corpus in latus trahens manibus corpus sustentare nisis, sed infirmis, tum vomitus et alvi et urinæ exoneratio involuntaria, citissima, mente constante.

Hæmatemesis. (Sanguinis effluvia a Nuce Vomicâ inter primum magis quam inter secundum virium ordinem referenda videntur.)

(Tormina discindentia cum vomituritione).

145 *Tormina strictorio lacerantia.*

Tormina strictorio lacerantia ab utroque latere, in pubis regionem convergentia.

Tormina strictoria a latere sinistro, supra umbilicum.

Tormina forficantia. (Post primam horam observatum.)

Dolor punctorius in abdomine. (Quartâ et sextâ horâ observatum.)

150 *Molimina herniæ.* (A quintâ ad septimam usque horam observatum.)

Vulsio et palpitatio sub cute musculorum artuum, maxime vero abdominis musculorum.

A contusione quasi dolor musculorum abdominalium, tactu et motu tantum percipiendus.

Abdomen tactu dolorosum.

Egestiones parvæ, crebræ.

155 Cum excrementis alvinis sanguinis excretio.

Hæmorrhagia ex ano.

Micturitio.

Micturitio pomeridiana.

Post mictum pressio in vesicæ collo.

160 Ante mictum dolor in vesicæ collo.

Inter mictum pruritus in urethrâ.

Inter mictum dolor in vesicæ collo ardens et lacerans.

Urethræ orificium quasi a vulnere dolorosum post vel ante mictum.

Pruritus ardens in penis glande, posteriori parte. (Sextâ horâ observatum.)

165 Pruritus in scroto.

Calor in testiculis. (Quartâ horâ observatum.)

Lancinatus in testiculo.

Tentigo diuturna, rigiditas penis.

Blennorrhagia urethræ.

170 Juncturarum mobilitas diminuta.

Rigiditas artuum, una cum vulsionibus.

Rigiditas, tensio artuum. (Circa octavam et decimam sextam horam observatum.)

Constrictionis sensus vehemens per totum corpus.

Sensus in musculis (scapularum, dorsi, artuum) quasi aliquid rursum versum traheretur, magis spasmodicus, quam dolorosus.

175 Quasi a verberatione dolor omnium membrorum.

Torpor omnium membrorum.

Lassitudo ingens.

Ardens pruritus supra totum corpus.

Punctus ardens hinc inde in corpore.

180 Ardor per totum corpus. (Internus ardor vel sensus tantum caloris ardentis esse videtur—sextâ et duodecimâ horâ observatum.)

Calor mere internus, ex angore natus, subsequo frontis sudore. (Post aliquot horas observatum.)

Calor internus cum pulsu pleno ab horâ in horam auctus, cum siti—tum agrypnia. (Octavâ et decimâ sextâ horâ observatum.)

Agrypnia. (Octavâ horâ observatum.)

Anxietas diaphoresin causans, ad minimum frontis.

185 Post anxietatem nausea, respiratio cita, tum tussis sicca a nauseâ oriunda, et vomituritio et vomitus.

Asthma, et anxietas sensim per aliquot horas crescens, respiratione sensim breviore, sudoribus identidem e toto corpore erumpentibus.

Inter et post anxietatem ingentem sudor profusus.

Sudor duorum dierum. (Post sedecim horas observatum.)

Cum calore et pulsu magno, frequente, lecti appetentiâ et siti aquæ. (Quadragesimâ octavâ horâ observatum.)

190 (Sudor lateris ægroti putridus).

(Sudor fœtidus in latere).

Dolor continuus in calottâ, tactu aggravatus.

Tumores dolorosi in fronte.

Oculi cantus quasi purulentus.

195 Oculi cantus quasi a vulnere dolorosus.

(Amaurosis aliquot horarum). (Post nychthemerum observatum.)

(Dolor punctorius in oculis).

Ophthalmia, chemosis. (Inflammationes ex Nuce Vomicâ ad vires secundi ordinis referendæ videntur.)

Rectum supercilium tactu dolorosum.

200 Diapedesis sanguinis ex oculo, (et ex steatomate prope oculum).

In palpebris dolor strictorio lacerans.

Aurium tinnitus sibilans, sibilus tinniens.

Formicatio reptans, pruriens in aure internâ.

Saliva sanguinea.

205 Vacillatio dentium.

Casus dentium, vix antea vacillantium.

Circa labia miliares eruptiones, pus includentes.

Aposthemata parva in buccis, in femore dolorosis punctorio lancinantis vehementis furunculorum species. (In tuberculorum enim altæ duritiei, et ru-

brorum calidorumque medio puris collectio post 24 horas.)

Tuberculum sub cute in maxillæ inferioris superficie externâ, tactu tantum dolorosum.

210 Epulis dentis canini gingivæ, dolore tensivo et ardente.

Strictorio lacerans dolor in maxillis.

E naribus destillatio matutina.

Diurna destillatio cum nocturnâ gravedine.

Copiosum naris alterutrius stillicidium, obturatæ quasi a gravedine. (Primâ horâ observatum.)

215 *Pruritus narium obturatarum ut in gravedine.*

Narium internarum hyperæsthesia dolorosa.

Mucus narium sanguinolentus. (Primâ horâ observatum.)

Epistaxis diuturna.

Tussis nocturna.

220 Pruritus laryngis, tussim proritans.

Inter tussim dolor capitis, quasi cranium disrumperetur.

In tussi dolor epigastrii (quasi a contusione).

Halitus acidus pulmonum.

Respiratio extra lectum angusta, difficilis, in lecto justa.

225 Dolor pectoris horizontaliter pressorius, respirationem suffocans.

Dolor horizontalis pectoris, cum respiratione citâ.

Dolor in sterno mere diurnus (quasi pectus nimis curtum esset, inter respirandum).

Dolor pectoris constrictorius.

Dolor mere diurnus quasi a verberatione a sterno ad scapulas, cum lancinatione et asthmate inter motum et quietem.

230 Dolor pectoris strictorius.

Dolor strictorius in costis.

Dolor strictorius in nuchâ.

Juncturæ ipsarum vertebrarum colli dolentes.
Dolor strictorius in humeri capite.
235 Dolor strictorius in brachio.
Narcosis manuum, pedum.
Dolor dorsi strictorius.
Dolor dorsi strictorio lacerans. (Primâ horâ observatum.)
Dolor dorsi constrictorius.
240 *Dolor dorsi ardenti lacerans.*
Dolor in osse sacro.
Dolor mere diurnus in osse sacro, quasi a verberatione et quasi pars nimis debilis esset, ut a puerperio.
Dolor lacerans in lumbis.
Intertrigo in inguine.
245 Dolor tensivus in femore, quasi nimis curtum esset.
In ossis femoris capite lancinatus, quasi a luxatione.
Formicatio a pedibus sursum.
In poplitibus post sessum, inter surgendum, sensus, quasi nimis curti essent.
Poplitis tensio, rigiditas.
250 Dolor mere diurnus genuum, quasi a verberatione inter motum et quietem.
Dolorosi tumores in genu.
Eruptio miliaris ardenti pruriens in genu.
Tensio in suris.
Ardor pruriens in digitis pedum, quasi a gelu.
255 Fames magna.
Constipatio.
Inquietudo cum pupillis maxime dilatabilibus. (Horâ quinquagesimâ sextâ observatum.)

OBSERVATA ALIORUM.

Veckoskrift for Lakare, vol. ii. s. 169,
(A scrupulo in adulto.)

Inebriatio. (Post semi-horam.)

Singularis omnium artuum, præcipue genuum, rigiditas cum tensione.

Gressus vacillans cum metu labendi.

Motus convulsivi.

[5] Cardialgia diuturna.

SEUTTER, Diss. de Nuce Vom. L. B. 1691, § 11.

Convulsiones horrendæ.

Rigiditas omnium fere corporis partium.

Stupor omnium fere corporis partium.

STRANDBERG, ap. KIEMANDER's Med. Lag. s. 269.

Vehementes ventriculi affectiones.

Spasmi abdominis.

Anxietas ingens.

Convulsiones.

[5] Vomitus.

Diarrhœa.

JUNGHANSS, Diss. de Nuc. Vom. et Cort. Hippoc. Hal. 1770, s. 11.

Sudores validi.

HARTMANN, Diss. Spicilegia ad Nuc. Vom. Us. Med. Traj. ed. Viadr. 1785, s. 25.

Anorexia diuturna.

MATTHIOLUS, Comment. in Diosc. i. iv. cap. 23.

Nausea.
Vomitus ingens.
Sitis vehemens.
Diarrhœa enormis.
Pectoris angustia.
Subita virium prostratio.
Convulsiones.
Sudor frigidus.

Fr. HOFFMANN, Med. Rat. Syst. t. ii. p. 175.
(A granis 15 in puellâ 10 annorum.)

Anxietates summæ.
Vomendi conatus.

HUFELAND, Journ. d. Pract. Arzneik. vol. i. s. 125.
(A novem granis in adultâ.)

Debilitas artuum maxima, ut pedibus insistere non posset.
Tremor universalis.
Vertigo.
Stupor cerebri.
Angor.
Pulsus parvus, intermittens.

CONSBRUCH, ibid. vol. iv. s. 443, 444.
(A duabus drachmis in adultâ.)

Tormina intolerabilia? (Post unam horam.)
Angor ineffabilis.
Convulsiones horrendæ.
Opisthotonus per minutam, pluries repetens.
Facies tumida, prærubra.
Oculi spendentes, horridi.
Manus frigidæ.

Pulsus evanidus, ratione constante.

Dolor cessans cum sudore frigido. (Mors post duas horas.)

RADEMACHER, ibid. s. 573.

Pedum infirmitas, instabilitas.

Oris distortio.

Trismus, ratione constante.

Pruritus narium intolerabilis.

[5] Sensus quasi a formicis innumerabilibus, faciem obreptantibus.

Splendor objectorum auctus.

BERGIUS, Mat. Med. s. 149.

(A scupulo in adultâ.)

Pandiculationes summe convulsivæ.

Vertigo.

Evacuationes suppressæ omnes.

Dolor ventriculi et regionis epigastricæ per longum tempus.

PAPAVER SOMNIFERUM.

(Lacrymæ tinctura.)

Vis ad summum nychthemerum durat.

Excretio alvina.*

Diarrhœa pultacea.*

*(Vel statim potum Opium usu venit, vel intra primum horæ quadrantem.)

Tussis cava siccissima. (Statim post propinatum Opium surgit et statim iterum evanescit.)

Pupilla dilatata. (Primis horis.)

5 Calor diminuitur.

Pulsus lentus.

Respiratio lenta.

Frigiditas extremitatum.

Sitis inter frigus.

10 Anorexia.

Sapor acidus. (Dubius hæreo, utrum ad primi, an ad secundi ordinis vires sit referendum.)

Frigidus frontis sudor.

Morositas, spei abjectio.

Animi abjectio.

15 Lacrymatio miserabilis. (Primis horis observatum.)

Ex joco offensio lacrymabunda.

Sensibilitas diminuitur.

Taciturnitas adiaphora, indolens. (A minimâ dosi.)

Inagnitio necessariorum, objectorum solitorum.

20 Inattentio rerum externarum.

Somni species comatosi, palpebris semiclausis, bulbis retortis, ore plus minus aperto, inspiratione stertorosâ. (Post doses majores non multo post Opium sumptum, vel etiam confestim oritur.)

Coma vigilans.

Caput reclinatum. (Tetani species videtur; intra primam et secundam horam observatum.)

Narcotica formicatio in digitis, dum aliquid manu capessitur aucta.

25 Dorsum rectum rigidum. (Secundâ horâ observatum.)

Gemitus vagitosi inter somnum.

Clamor miserabilis inter somnum.

Somnus insomniis plenus.

Incubus.

30 Insomnia luculenta, tædiosa, frustrationum et offensionum variarum. (Secundâ horâ observatum.)

Blateratio futilis inter coma.

Irritabilitas imminuta.

Gravitas pedum post pastum. (Post duas horas observatum.)

Motus tardus, vacillans.

(Sequentes dolorosas sensationes, quamquam partim non diu post sumptum Opium oriuntur, tamen ad vires secundi ordinis pertinere videntur, quippe per minimas doses enatæ, in quibus vires primi ordinis Opii (stuporificæ) opinione citius diffugiunt insensibiliter. In præmagnis Opii dosibus vero vires primi ordinis ad sex et octo horas, immo ad mortem usque durant, stupore mentis omnes sensationes cujusvis generis opprimente.)*

35 *Distentionis abdominis, maxime ventriculi, sensus.

*Cardialgia, pressio in ventriculo quasi a lapide. (Post secundam horam observatum.)

*Ponderis sensus in abdomine circa umbilicum cum angore, caloris volatici interni sensu et infatuatione capitis. (Post horam observatum.)

*Pulsatio in abdomine.

*Tormina quasi a purgante. (Post semihoram observatum.)

40 *Menstruatio aucta. (Post duas horas observatum.)

*Tormina quasi a refrigeratione.

*Tormina simplicis doloris, quasi a contusione. (Secundâ horâ observatum.)

*Proctalgia pressorio distensiva, immanis. (Intra quartam et sextam horam observatum.)

*Dolor immaniter pressorius in latere pectoris dextro etiam extra respirationem, cum lancinatu in eodem latere inter inspirationem. (Post primam horam observatum.)

45 *Lancinatus in sinistro latere abdominis, vel extra respirationem. (Post tertiam horam observatum.)

*Dentium vacillatio. (Octavâ horâ observatum.)

*Odontalgia.

*Dolor maxillæ superioris.

*Dolor dentis nervi subtilis, exedens.

50 *Dolor strictorio lacerans in pectoris latere. (Horâ octavâ observatum.)

*Dolor strictorio lacerans in dorso.

*Pruritus in cute hinc inde pungens.

(Quæ sequuntur ad vires secundi ordinis sine dubio referenda.)§

§Pulsus fortior.

§Calor.

55 §(Animus contentus).

§(Mens vivida).

§(Desiderium veneris).

§(Appetitus auctus).

§Pupillæ contractæ.

60 §Diaphoresis aucta.

§Sudor universalis. (Quartâ horâ observatum.)

§Sapor insulsus et fere deletus. (Tertiâ horâ una cum fame caninâ observatum.)

§Famis caninæ accessus crebri. (Pluries intra viginti quatuor horas etiam tertiâ horâ observatum.)

§Alvi excretiones restrictæ.

65 §Vulsiones singulæ in temporum musculis.

§Vulsiones singulæ in brachiis.

§Agitatio brachii alterutrius convulsiva.

(Quæ sequuntur, inter reliquias observavi. Hæc partim secundi ordinis vires, partim sequelæ nimiæ doseos (an tertii cujusdam ordinis vires?) esse videntur. Ad posteriora referendæ sunt sequelæ post quotidianum Opii abusum, inter nos interdum, maxime vero apud gentes orientales observandæ.)†

†Vicissitudines animi serenitatis, curarum expertis, et morositatis.

†Respiratio difficilis, angusta, maxime noctu.

70 †Dolor constrictorius sterni et dorsi, inter motum percipiendus.

†Raucitas pituitoso trachealis.

†Vicissitudines caloris temperati et frigiditatis.

†Pupillæ dilatabiliores.

†Ventriculi debilitas.

75 †Stupor in pede narcoticus.

†Pes quasi rigidus et tam sensibilis, ut eo incedi non possit.

†Tumor pedum.

†Tormina ante et post sedem.

†Sensus in molimine ad alvum deponendam, quasi via ad rectum præcluderetur (paresis recti?).

80 †Sensus in mingendi molimine, quasi via ad urethram præcluderetur (vesicæ paresis?).

†Aëris liberi intolerantia et sensus inde quasi a refrigerio.

†Tussis post pastum invalescens.

OBSERVATA ALIORUM.

De la Croix, Journal de Med. tom. xxxix.

(A granis duobus solutis et per clysterem injectis.)
Capitis obnubilatio. (Statim post ingestum Opium.)
Stupor dormituriens.
Stertor.
Pulsus magnus, rarus.
[5] Respiratio gravis, alta.
Trismus.
Abdomen tumidum.
Vomitus viridis.
Tussis inter deglutitionem. (Mors horâ duodecimâ et tunc effluxus materiæ albæ, spumosæ, ex ore: cadaver putridum maxime.)

Rademacher in Hufeland's Journ. d. pr. A. tom. iv. 3.

Dormituritio palpebris semiclausis.
Angor summus.
Floccilegium.
Vulsiones singulæ brachiorum.

Crumpe, Natur. u. Eigensch. d. Op.

Respiratio lentior, difficilis, stertorosa.
Pulsus magnus, lentus.
Animus stupidus, erga objecta indifferens.

Hist. de l'Acad. des Sc. à Paris, 1735, s. 6.
(In juvene a drachmâ.)

Maculæ hinc inde in corpore lividæ. (Post quindecim horas.)

PYL, Aufsatze, Samml. I. H. 85.

(A drachmâ.)

Corpus gelidum, rigidum.

Trismus. (Post nychthemerum cadaver putridum.)

Id. ibid. s. 94, 95.

Vomituritio longa.

Facies collapsa, pallida.

[5] Oculi aperti, pupillis sursum retortis.

Respiratio brevis, stertorosa, per semi-minutum identidem cessans.

Constipatio decem dierum, fatalis.

VICAT, Pl. Venen. de la Suisse, p. 226.

(In viro a duabus drachmis Laudani.)

Stupor, insensibilitas, et tamen apposite respondet.

Oculi fixi, stupidi, languidi, emorientis instar.

Pulsus vehemens, celer, durus.

Respiratio difficilis, impedita.

[5] Sudor largus. (Duodecim horarum.)

WILLIS, de Animâ Brut. p. 298.

Cardialgia vehemens.

Languor.

Animi deliquium.

Mens constans.

[5] Scotomia. (Et mors subsequens, tertiâ horâ.)

Idem, Pharmac. Rat. p. i. p. 306.

Memoria penitus amissa.

His. de l'Ac. des Sc. 1735, p. 4.

(In juvene a drachmâ in vino datâ.)

Maculæ lividæ hinc inde in corpore. (Decimâ quintâ horâ post captum Opium; post mortem tubercula livida hinc inde in corpore et putredo præsentanea.)

HARGENS, in HUFEL. Journ d. pr. Arz.
vol. ix. p. 2, p. 201.

Salivatio.

CLARCK, Essays and Obs. Ph. and Lit.
Ed. 3, 1771.

Vertigo.
Mentis perturbatio.
Virium lapsus.
Scintillæ in visu.
[5] Visiones terrificæ.
Calor cum siti.

F. PLATER, Obs. lib. i. p. 139.
(A clystere Opiato.)

Linguæ titubatio.

RAGLIV, Prax. Med. lib. i. p. 95.
(Ab Opiatis nimiis.)

Paralysis.

SCHWEIGKERT, in HUFEL. Journ. d. pr. Arz.
xi. 2, p. 148.

Convulsiones cum facie lividâ.
Asphyxia.
Singultus convulsivus.

DE RUEF, App. ad Act. Nov. N. C.
p. 63.

Vis voluntatis minimo abigenda nutu.
Tranquillitas mentis.
Alacritas animi.
Insomnia hilaria.

REINEGGS, in BLUMENBACH's Med. Bibl.
vol. iii. p. 374, 385.

Paralysis linguæ.

Flatulentia.

Anorexia.

Venæ in facie tumidæ.

[5] Spuma ante os.

Salivatio.

Hæmorrhagia narium.

Titubatio.

Sui non conscius.

[10] Stupiditas.

Memoriæ lapsus.

Indifferentia erga dolorem et voluptatem.

Erga sensationes subtiliores et sensum modestiæ stupiditas.

Horrescentia.

[15] Periculi impavidus.

Temeraria ferocitas.

Anxietates intolerabiles. (Post nychthemerum ab Opio capto.)

Flacciditas, torpor.

Infirmitas et collapsus virium.

[20] Impotentia virilis.

Calor luridus.

Hydropicus corporis status.

Stupet adstantes, oculis lacrymâ suffusis, nec tamen scit, quid agatur, nec agnoscit obvios.

Ore aperto loqui nescit.

[25] Facta inepta patrat.

Vacillatio.

Balbuties.

De frigore querelæ.

Cibos appetit et morsu vix uno deglutitio cætera fastidit.

[30] Post ebrietatem ecstasis.

Post ecstasin ex opio anxietas.

Inquietudo, tremor.

Ineptitudo ad omnia negotia.
Frigiditas in re venereâ.
[35] Nausea omnium rerum.

CARDIN, Voyage en Perse, Amst. 171.

Ecstasis. (Post primam ab Opio capto horam nata, ad quinque usque horas durans.)
Post ecstasin mœstitia, animus abjectus.
Frigiditas.
Stupor.
[5] Omnium laborum impos.
Languor, imbecillitas.
Animi dotes omnes, sensus omnes hebetes.
Dolores per medullam ossium penetrantes deterrimi.

J. JUNCKER et FR. BOHMER, Diss. Cas. Matr. Larg. Opii Usu Tractatæ, Hal. 1744.

In membris et nervis omnibus sensus tremulus.
Modo ignis volatici, modo aquæ gelatæ per venas micantis sensus.
Trunci curvatio arcus instar.
In corde ardor quasi a prunis et dolor quasi a dilaceratione intestinorum, ita ut pessumdari sibi videretur.

SAM. BARD, Diss. de Vir. Opii, Edinb. 1765.

Pulsus quatuordecim ictibus lentior. (Intra primas quatuor horas.)
Pulsus triginta ictibus auctus. (Post circiter decem horas.)

MUZELL, Wahrnehmungen, ii. p. 131.

Cephalalgia vehemens.
Anxietas ingens.
Dementia.

Tetanus.
[5] Motus convulsivi.
Epilepsia.
Facies rubra, tumida.
Respiratio gemebunda, lenta. (Post quatuor horas.)
Pulsus lentus. (Per viginti circiter horas.)
[10] Sudor profusus.
Insultus epileptici cum deliriis vehementibus.

E. C. Grimm, Act. Nat. C. vol. iii. obs. 19.
(A grano ante somnum capto in adulto.)

Somnus anxius: insomniis vexatus tristissimis, ita ut somnolentus in perpetuo delirio versari videretur.
Respiratio crebra, angusta, anxia. (Post plures horas.)
Pulsus frequens debilior naturalis.
Sudor universalis. (Post octo horas.)
[5] Diarrhœa lenis, fœtidissima.
Tumor faciei lividæ luridæque.
Palpebrarum inferiorum tumor.
Lingua alba.
Crurum debilitas.
[10] Torpor.

(A granis tribus.)

Mœror.
Animæ virium debilitas.
Nisus virium debilitas.
Nisus in decubitum.
[15] Anxietas præcordiorum. (Secundâ horâ.)
Dormituriens somnum capere non potest.
Pulsus tardior.
Hypochondriorum, imprimis dextri dolor.
Tensio hypochondriorum, tactu dolorificentiorum. (Quartâ horâ.)
[20] Respiratio inordinata, suffocationem minans.
Spiritum summa molestia trahit, anxius, ore aperto.

Titubatio.
Fames canina, cum abhorrescentiâ ciborum.
Urina citrini coloris, cum sedimento multo.
[25] Inter pulsum tardiorem et debiliorem pallor et frigiditas artuum, sudore frigido perfusorum.
Ructus. (Quintâ horâ.)
Raucedo cum faucibus siccissimis, lingua alba.
Amaror oris.
Nausea.
[30] Somnus anxius, insomniis obrutus. (Horâ septimâ.)
Somnus parum reficiens inter sudorem universalem.
Excrementa liquida spumosa, cum ani pruritu, ardore, summoque tenesmo.
Habitus corporis pallidus, lividusque.

G. Chph. Schehammer, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 8. obs. 12. (In viro a $3\frac{1}{2}$ granis.)

Somnus insomniis gravis et turbulentus. (Statim.)
Post evigilationem linguæ motus impeditus. (Post quadrantem horæ.)
Siccitas oris, ut verba vix proferre posset.
Vertigo, circumgyrationis sensus. (Horâ exactâ.)
[5] Capitis turbatio, vera notitia nullius rei, eorum quæ legit sensum assequi non potest.
Hallucinatio quasi in aëre suspensus esset, aut volitaret et omnia circumverterentur.
Hallucinatio quasi oculos quater majores habeat, quasi corpus suum monstrosæ sit magnitudinis.
Titubatio, progredi non potest nisi difficulter et titubanter.
Immobilitas artuum aucta.
[10] Ideæ vagæ.
Obtusus animus, insensibilis, existentiæ suæ vix conscius, apte tamen satis respondet.
Præter auditum et visum, privatio sensuum gustus,

olfactus, tactus quoad objecta externa; sui vero corporis frigiditatem sentit.

Frigiditas totius coporis, stuporem membrorum inducens. (Post sesquihoram.)

Frigus in dorso.

[15] Pulsus suppressus, vix perceptibilis.

Vix pedes movere, vix incedere potest coactus.

Pulsus major. (Post tres horas.)

Somnus horribilis, oculis clausis amens sibi videtur esse.

Pruritus; formicatio in omnibus membris. (Circa quintam horam; fricatione tactus sensus restituebatur.)

G. Young, über Opium, Neue Edinb. Vers. Altenb. 1762, p. 148, etc.

(A 30 guttis Laudani.)

Lassitudo post somnum longa.

Tumor faciei.

Cutis sicca, calida.

Interdum sudor lenis.

[5] Lingua alba.

Constrictio pectoris, et quasi rigiditas, respiratio difficilis.

Raucedo.

Hæmoptysis.

(A 40 guttis Laudani.)

Raucedo maxima.

[10] Aurium susurrus.

Vertigo.

Turbatio capitis.

Somnus successionibus terrorificis interruptus.

Inquietudo.

[15] Inter evigilationem languor cordis.

Sensus cruris fere deletus.

Asthma spasmodicum.
Somnus inquietus, gemebundus, suspiriosus.
Post evigilationem nausea vomituriens. (Post duas horas.)
[20] Cephalalgia.
Pulsus celer.
Ventriculi dolor constrictorius, intolerabilis, agonizans. (Pilulis Opiatis post prandium captis.)

STALPAART van der WIEL, Cent. ii. obs. 41.
(A semi-drachmâ.)

Inter somnum priapismus.
E somno expergefacto impotentia virilis.

Idem, Cent. i. obs. 42.
(A pilulâ.)

Sopor et stupor talis ut nec quidquam responsi ipsi extorqueri posset.

COCQ, apud eund. ibid.
(A tincturâ Opii.)

Memoria diu abolita.

ANEMONE PRATENSIS L.

(Herbæ totius succus sole inspissatus.)

Vis 80 ut plurimum horas durat.†

Vertigo titubans quasi ab ebrietate, cum calore capitis interno, et pallore faciei, naturaliter calidæ, maxime vesperi.

Vertigo quasi ab ebrietate.

Vertigo, consistere recte non posse putat. (Intra primam horam observatum.)

Vertigo, capessere rem posse non putat. (Intra primam horam observatum.)

5 Vertiginis accessus, ebrietas, calor.

Vertiginis species, ab oculorum resupinatione, quasi casurus esset, vel quasi saltaret.

Post pastum ebrietatis sensus.

Inter pronationem sensus in capite, quasi prolapsurus esset homo.

Pupillam contrahit initio.

10 *Oscitatio.*

Frigiditas.

Frigus immane, postea caloris interni cum horripilatione sensus mixtus; postea calor ardens universalis, pulsus citissimus, respiratio citissima, agonizans.

Horripilatio.

Horripilatio reiterata.

15 Horripilatio quasi a sudore erupturo.

† Hoc remedium, secundum experimenta recentia, vires per decem, duodecim dies retinet.—*Ed.*

Cum tremore frigoris sensus, aliquot minutarum intervallo recurrens, calore parvo subsequo, sine sudore.

Circa vesperam in cubiculo calido frigus, seu frigiditatis sensus, caloris volatici sensu intermisto.

Frigus sine cute anserinâ vespertinum.

Adipsia.

20 Fames canina. (Statim post potam Pulsatillam observavi, sed brevis temporis.)

Dolor exedens in ventriculo quasi a fame canina. (Etiam circa horam octavam observavi.)

Appetentia (statim post potam Pulsatillam observavi) escarum, nescit quarum, nec grate sapit quo vescitur.

Fames, sed appetitus rei certæ nullus.

Sensus quasi a vacuo in abdomine, quasi abdomen exenteratum esset.

25 Vacillatio consilii, indeterminatio summa.

Vox hæret, respondere tædet.

Nullius rei amor, ex nullâ offensio.

Tædium, fastidium omnium rerum.

Palpitatio et anxietas ingens, ita ut vestimenta abjici debeant.

30 Anxietas quasi a calore aëris ambientis.

Angustia nocturna inter evigilationem, qua crimen commisisset.

Calor anxius quasi ab affusâ aquâ calidâ, fronte gelidâ.

Manus hæc calida, illa frigida.

Caloris externi intolerantia, venæ tumidæ.

35 Afflatus quasi ab aëre nimis calido, cephalalgiam causans.

Quasi a sanguinis ebullitione agrypnia.

Caloris sensus nocturnus sine siti. (Aliquando post trigesimam sextam horam observavi.)

Per noctem angor quasi a calore.

Calor et dein horror.

40 Calor subitus cum faciei sudore magno, tremore artuum et scotomiâ syncopode.

Subitaneus rubor faciei pedum horrore et trepidatione.

Calores volatici. (Etiam seriorum horarum observatio, v. c. duodecimæ.)

Calor totius corporis, exceptis manibus, cum pressorio supra orbitam dolore et æstuatione ejulatoria.

Sudor mitis universalis.

45 In faciei latere dextro sudor. (Etiam horâ trigesimâ sextâ observatum.)

Agrypnia.

Aversatio negotiorum, indeterminatio, anhela respiratio, æstuatio.

Hypochondriaca morositas, quævis ægre ferens.

Per morositatem obrigescit infans.

50 Circa externa non incuriosus, sed negligens. (Circa primam horam observatum.)

Ideæ permultæ, sed instabiles. (Intra primam horam observatum.)

Anxietas, nescit quo se vertat. (Intra primam horam observatum.)

Anxietas, annihilari, pessumdari se putat. (Primâ horâ observatum.)

Anxietas tremula, quasi mors instaret. (Primâ horâ observavi.)

55 Ægritudo animi. (Etiam serioribus horis observavi.)

Ut ab ebrietate hesternâ infatuatio et dolor capitis.

Infatuatio capitis, cogitationes evanidæ.

Fatuitas et vertigo, motu excitata.

Visus obtenebratio cum vomituritione et pallore.

60 *Visus obnubilatio brevis.*

Visus obnubilatio per aliquot dies repetens.

Oculus alteruter candelæ lucem tolerare non potest lancinanti dolore affectus, fere sine inflammatione

albugineæ, palpebris conniventibus. (Post tres horas observatum.)

Visus vitium, candelæ flamma nimbo stipata videtur, stellæ instar.

Visus duplex. (Aliquando etiam post plures horas observavi.)

65 Visus et auditus abolitus, cum dolore capitis strictorio et gravitatis et formicationis sensu in cerebro, tumque frigus.

Cephalalgia quasi a cerebri arteriarum pulsatione. (Post sex horas observavi.)

Murmur in aure, modulatione pulsuum.

Tinnitus aurium oscillans, quasi a pulsatione baculi ferrei. (Post tres horas.)

Tinnitus aurium. (Inde a quartâ horâ ad octavam observavi.)

70 Tinnitus in aure acutus.

Plethorâ organi auditus. (Circa octavam horam observatum.)

Auris externæ calor, rubor, tumor. (Post aliquot horas.)

Circa aurem externam calor, sudor.

Anorexia sapore integro.

75 (Anorexia a ciborum sapore deleto et quasi a plenitudine ventriculi).

Sapor in posteriori faucium parte herbaceus, putridus.

(Mane putridus oris halitus).

Anorexia panis veteris et carnis.*

Sapor esculentorum omnium imminutus.*

80 Sapor carnis deletus.*

*(Circa quartam, octavam et decimam sextam horam observata.)

Sapor omnium esculentorum amarus, tum frigus cum sudore frigido.

Sapor amarus cum appetentiâ citri acidi.

Sapor amarus, biliosus, continuus, maxime post cibum captum.

Sapor terreus cum vomituritione. (Etiam post primam horam observatum.)

85 Sapor empyreumaticus in ore.

Sapor pituitæ tussi ejectæ empyreumaticus instar jusculi cancrorum vel olei tabaci. (Post tres et sex horas observatum.)

Ructus crebri cum sapore ingestorum.

Regurgitatio amari liquoris ad fauces usque.

Amaror in ore post vomitum.

90 Sensus quasi a corrupto ventriculo.

Sensus in ventriculo quasi a nimiâ ingurgitatione escarum et regurgitatio escarum quasi evomendæ essent.

Salivatio.

Cum salivatione continuâ 24 horarum, vomituritio.

Salivæ aqueæ effluxus ex ore copiosus.

95 Nausea vomituriens intolerabilis, sine vomitu. (Primâ horâ observatum.)

Nausea vomituriens, sine vomitu, appetitu integro, cum menstruorum suppressione.

Nausea vomituriens inter soporem (vel somnum) emergens, cum appetitu integro, vel panis fusci. (Aliquando circa vigesimam horam observavi.)

Vomitus cibi pridem capti.

Vomituritio ab escâ solidâ et spissiore, carne, pane.

100 Nausea vomituriens cum ingrato sensu (dolore) ad gulam adscendente.

Vomituriens nausea ad fauces usque tendens.

Sensus quasi in gulâ reptet vermis.

Vomitus escarum vespertinus, tum amaror oris et dentes obtusi.

Vomitus brevis biliosorum.

105 Vomitus nocturnus cum dolore dorsi lancinanti strictorio versus scapulam.

Post vomitum ardor in gulâ.

Cum borborygmis in hypochondrio, vomituritio.

Borborygmi in abdomine murmurantes ut a flatibus.

Diarrhœa primo viridis, dein mucosa.

110 Excrementa alba. (Etiam intra decimam octavam et vigesimam quartam horam vidi.)

Sedes ex merâ pituitâ lutescenti albâ constantes, cum pauco sanguine intermisto. (Nonnunquam circa duodecimam horam observavi.)

Sedes crebræ ex pituitâ constantes, cum torminibus ante singulam sedem.

Diarrhœa cum torminibus discindentibus.

Invitatio crebra ad alvum deponendam, quasi diarrhœa identidem eruptura esset.

115 Sedes acres.

Diuresis.

Micturitio.

Urina subinde rubra.

Urina fusca.

120 Post mictum dolor in urethræ orificio pressorio formicans.

(Virus venereum ex cancro præputii in glandulas inguinis transferri et bubonem excitare videtur).

Post mictum formicatio et pressio in glande penis.

Sensus lancinanti pruriens sub præputio. (Etiam circa quadrantem horæ post ingestam Pulsatillam observatum.)

Leucorrhœa lactea cum tumore vulvæ.

125 Leucorrhœa lactea indolorifica.

Leucorrhœa pituitæ spissioris lactei coloris, indolorifica, maxime inter decubitum percipienda.

Blennorrhœa colore et consistentia seminis humani, cum ardenti dolore, maxime statim post mictionem.

Titillatio continua in naribus.

Sternutatio. (Circa quartam horam et ad duodecimam observatum.)

130 In nasi alâ exulceratio superficialis serum fundens.

Coryza cum gustus et olfactus jacturâ.

Gravedo (Dubius hæreo, an gravedo ad vires secundi ordinis sit referenda. Sed monendum, Pulsatillam plerumque agere ita, ut vires primi et secundi ordinis per paroxysmos aliquot repetant durante curriculo operationis) cum exulceratione narium.

Nares obturatæ, exulceratæ.

(In nasi radice dolor inter pronationem quasi ab aposthemate interno).

135 *Epistaxis.*

Sanguinis e naribus effluxus cum gravedine.

Tussis. (Circa quartam horam observatum.)

Tussis cum expectoratione.

Tussis sanguinea.

140 Tussis nocturna lancinatum in latere gignens.

Inter tussim dolor pectoris.

A tussi dolor in humero.

Inter tussiendum lancinatus in dorso.

Raucedo aphona.

145 *Pruritus in oculis.*

Lippitudo.

Oculi in aëre libero, frigido aqua suffusi.

Oculo uno lacrymante dolor capitis strictorius.

Palpebræ mane conglutinatæ.

150 Siccitas palpebrarum. (Circa duodecimam horam observatum.)

In canto interiori oculorum dolor pressorius.

Oculorum siccitas et sensus matutinus quasi a corpore alieno premente. (Etiam inter reliquias observatum.)

Hordeolum cum inflammatione albuginæ modo unius,

modo alterius canti oculorum, et dolor strictorio tensivus in eo a motu musculorum faciei inter nares exulceratas.

Lancinatus ex fronte per oculos penetrans.

155 In parotide dolor lancinans.

Dolor glandularum submaxillarium.

Dolor terebrans in glandulis submaxillaribus, vel inter quietem partium. (Post quartam horam observatum.)

Dolor strictorio tensivus in glandulis submaxillaribus.

Dolor inter deglutiendum, quasi glandulæ submaxillares in faucibus prominerent et quasi ab excoriatione dolerent. (Post octo horas observatum.)

160 Angina lancinans.

Glandula parva dolorosa intra tragum auris et articulationem maxillæ.

Sensus quasi a tumore in gulâ, modo inferne, modo superne sedente. (Post sextam horam observatum.)

Dolor ut a vulnere in gingivis.

Dolores vento aucti.

165 Odontalgia lacerans.*

Lacerantes dolores in maxillâ inferiori.*

*(An potius strictorio tensivus dolor? (quasi nervus intendatur et per vices subito relaxetur) qui Pulsatillæ proprius est, et falso pro lacerante venditatur.)

Strictorio vulsorius dolor in dentibus, a potu frigido exasperatus.

Dens inter mordendum dolorificus.

Dolor dentium, quasi protruderentur.

170 Dolor adstrictorius in maxillis ut ab acidis, cum horripilatione et sudore faciei frigido.

Dolorem dentium in gingivis (punctorium exedentem), maxime circa vesperam excitat, qui plumei lecti calore exasperatur denudatione vero et aëris liberi

frigidi afflatu lenitur, et somno vespertino deletur. (Post sex horas observatum.)

Inter dolores vespertinos frigus.

Dolor lancinanti pruriens in aure internâ. (Post sex horas observatum.)

Lancinatio in occipite per aures.

175 Lacerationes vulsoriæ singulæ per aures. (In duodecimâ horâ observatum.)

Vulsiones in auribus.

Tumores parvi in calottâ dolorosi quasi ab apostheunate.

(Exanthema pustularum tactu dolorosarum in collo sub mento).

Tumor nuchæ, utrinque ad colli latus, usque ad carotides protensus, tactu tantum sed vehementer dolorosus quasi ab aposthemate intus latente.

180 Caput sustentare nequit.

Cephalalgia strictorio tensiva in fronte supra orbitas oculorum apertione aucta.

Crepitus cerebri inter eundum, et ad pulsum arteriarum modulatus.

Dolor capitis discindens.

(Hemicrania disruptoria, quasi oculi e capite casuri essent).

185 Dolor pressorius in capite in pronatione.

Dolor capitis quasi a nimiâ ingluvie vel quasi a ventriculo carne nimis pingui ingurgitata corrupto.

Dolor capitis ut ab agrypniâ vel crapulâ. (Aliquando duodecimâ horâ observatum.)

Dolor capitis quasi a gravedine, vespertinus, tum calor in lecto siccus et coma somnolentum cum phantasiis delirantibus.

Dolor lancinans in occipite, decubitu exasperatus, erectione trunci evanidus. (An punctorius interdum?)

190 Hemicrania lancinans.

Dolor lancinans in nuchâ.

Dolor strictorius tensivus in nuchâ.

Dolores strictorio punctorii in nuchâ, intra scapulas et in dorso.

Dolor lancinans intra scapulas vel inter quietem.

195 Dolor intra scapulas inter motum lancinans, respirationem præcludens. (Pulsatillæ est, etiam aliorum partium dolores excitare, quæ respirationem angustant.)

Dolor pressorius in dorso sursum.

Dolor punctorius dorsi. (Secundâ horâ observatum.)

Dorsi rigiditas dolorosa, asseris ad instar.

In quartâ lumborum vertebrâ dolor pressorius, maxime post itum.

200 Dolor lancinans in osse sacro et abdomine, cum torminibus discindentibus, respirationem præcludentibus.

Primo lancinatio in osse sacro, tum in abdomen tendens dolor discindens fit et lancinans, respirationem præcludens, tum in capite formicatio, gravitas et strictorius sensus, visum et auditum aboliens, tum frigus quasi ab aquæ frigidæ perfusione.

Dolor in scrobiculo pressorio strictorius, mane, qui paulo post in latus pectoris migrans, lancinans et demum dorsum progressus, lacerans fit. (Non nisi vigesimâ quartâ circiter horâ observavi.)

Pulsuum arteriarum sensus in scrobiculo.

In pectoris alterutrâ parte dolor strictorio tensivus, per respirationem auctus.

205 In sterno dolor strictorio tensivus.

In pectore dolor lancinans inter motum corporis.

Dolor peetoris inter respirationem lancinans durantibus menstruis.

Per transversum pectus spasmodicus sensus.

Lancinatus in latere non nisi inter decubitum. (Plures Pulsatillæ dolores non nisi inter quietem emergunt.)

210 (Dolor crampoides primo in dextro latere, tum in sinistro, tum in pectore).

Cardialgia.

Cardialgia inter menstrua.

Pressio in abdomine.

Dolor strictorio tensivus in hypochondrio.

215 Dolor strictorio tensivus in abdomine ritu dolorum spuriorum in partu. (Etiam quartâ et quintâ horâ observatum.)

Dolores strictorii et strictorio tensivi ex abdomine per vasa spermatica in testiculos penetrantes, testiculis alte pendentibus. (Post sextam horam observavi.)

Dolores constrictorii in uteri sinistrâ parte, quasi ad partum.

Menstrua septem dies anticipata.

Dolor strictorio tensivus in lumbis. (Lumbaginem artificialem dixeris.)

220 Dolores strictorio lacerantes hinc inde in toto corpore repetitis sed parvis et volaticis accessibus.

(In flexione brachii, tendinum cubiti flexorum dolor tensivus).

Dolores strictorii in brachiis ab humero ad carpum usque parvis sed repetitis accessibus. (Verisimile est, et hos dolores fuisse strictorio tensivos, quasi nervus filo paulatim magis magisque attraheretur et subito iterum relaxaretur, quales fere sunt in musculis a Pulsatillâ nati dolores.)

In humeri juncturâ dolor lancinans inter brachii motum citum.

Dolor strictorio tensivus in brachiis internis ad carpum usque.

225 (Inter brachii pronationem dolor tensivus tendinum pronatorum).

Dolor in humero a sublatione brachii.

Supra cubiti flexuram tumores subcutanei (non inflammati) tactu dolorosi.

Dolor immanis pressorio disruptorius in femoris et humeri musculosis partibus. (Post secundam horam observatum.)

Femoris inter eundum subita asthenia paralytica volatica.

230 In glutæis post sessum dolor simplex quasi a contusione. (Vel quasi ab aposthemate interno?)

Pedum gravitas et strictorius in iis dolor, minus in brachiis.

Pustulæ in pede serum fundentes cum dolore ardente.

Fragor genu.

Calor pedum.

235 Tumor pedum.

Tumor ruber calidus pedum (erythema) cum dolore tensivo urente, inter consistendum lancinante.

Dolor strictorio tensivus in suris.

In plantis a statu dolor formicanti punctorius, et quasi a narcosi.

Lancinatus singuli in plantis et digitorum apice inter quietem.

240 (Dolor lacerans in plantis et supra genu).

Dolor surdus in volâ, sive inferiori pollicis pedis facie.

In plantis, supra genu, et in dorso lacerans dolor.

Digitorum pedis dolor ut a pressurâ calcei.

Dolor in plantæ medio, dum insistitur, quasi ab excrescentiâ protruberante, cum lancinantibus versus suram.

245 In calcaneo secans dolor inter lecti calorem.

Dolor strictorio lacerans modo in altero artu, cum frigore et frigiditate.

Dolor strictorio punctorius in artubus et articulationibus maxime, tactu quasi a contusione dolorosis.

Vulsiones singulæ artuum et totius corporis in somno.

250 In artubus tremoris sensus anxius, trepidatio.

(Artus quasi contusi).

In artubus anxietas tremula, sive trepidatio requie, decubitu, sessu aucta, motu diminuta.

In toto corpore sensus ingratissimus ad desperationem summam et impotentiam animi adigens, neque dormire, neque requiescere ullo modo sinens.

A strictoriis in artubus et toto corpore doloribus trepidatio.

Sensus ingratus in toto corpore pernox quasi a vigiliâ longâ, cum capitis vappiditate ut a crapulâ. (Duodecimâ horâ observatum.)

255 Vulsorio strictorius dolor quasi a laqueo in artuum musculis, non in juncturis.

In corporis latere dextro sudor.

In corporis latere sinistro sudor. (Post horam quadragesimam etiam observavi.)

Corporis immobilitas rigida.

Gravitas totius corporis. (Post octo horas observatum.)

260 Pulsatio arteriarum molesta in omni corporis parte, tactu maxime percipienda.

Sensus prurienti punctorius in cute quasi a pulicibus innumerabilibus.

Ulcera, si quæ sunt, sanguiflua fiunt.

In ulcere dolor lancinans mordax, circumcirca pruritus.

Furunculi hinc inde.

265 Amenorrhœa cum frigiditate, horrescentiâ et tremore pedum.

Menstruorum suppressio. (In fœminâ 47 annorum, in alterâ 48 annorum et in aliis. Maxime tum videbatur menstrua (bis et pluries) supprimere, si in plenilunio redire consueverant. Sed vis hæc secundi ordinis esse videtur.)

Constipatio pertinax.

Dormituritio continua insomniosa.

Somnus comatosus, inquietus, agitatorius.

270 Somnus insomniosus.

Blateratio inter somnum.

In somno clamor de cane atro, feli.

Agitatio in somno.

Terror, succussio inter somnum.

275 Experrectio succussoria e somno et delirium de apibus abigendis.

Somnus nimis protractus, palpebris clausis, statim a principio comatosus, phantasticus, insomniis plenus.

Sitis aquæ vespertinus.

Post calorem evanidum sitis intensissima, maxime cerevisiæ et lingua albida.

Pupillam dilatat. (Frequentius in vi secundariâ observavi, quamquam et interdum horâ sextâ dilatabiles maxime, interdum et post horam trigesimam sextam contractiores et parum dilatabiles viderim pupillas, necdum satis itaque constat, cujus ordinis ambo symptomata?)

280 Sensibilitas dolorifica abdominis, tactu excitanda. (Non nisi inter reliquias observavi.)

OBSERVATA ALIORUM.

Ant. Stoerk, Von der Pulsatille, Frft. 1771.

In linguâ primo dolor mordens, tum calor diutinus.

In brachio hinc inde dolores lancinantes.

In brachio nocturnus pruritus.

Menstruatio aucta. (In multis.)

[5] In brachio vesiculæ, pure dein refertæ et squamis deciduæ.

Vomituritio.

Enuresis. (In permultis.)

Sudor magnus, fœtidus, nocturnus.

Ardor urinæ molestus.

[10] Materiæ aquosæ fœtidæ secessus ex urethrâ.

Oculi aquâ suffusi, lacrymis abundantes, lippi. (In nonnullis.)

Salivatio.

Dolor in oculo, quasi cultro radatur.

Lancinans in abdomine dolor.

[15] Ardentes, lacerantes, vagi dolores a digitis pedum ad inguen usque.

Hæmorrhois fluida. (Per tres dies.)

Tormina lacerantia.

Diarrhœa. (In multis.)

Enuresis fere continua.

[20] Diarrhœa non debilitans.

Dolores summi lacerantes, terebrantes, secantes in oculo.

Menstruatio copiosa. (In menstruorum suppressione.)

Purulenta excretio e nare sinistrâ.

SAUR, in BERGII, Mat. Med. p. 517.
(A vapore.)

Tumor et rubor palpebrarum.

Obnubilatio visus.

HEYER, in CRELL's Chem. Journ. ii. p. 502.

Capitis lancinans dolor.

Enuresis.

BERGIUS, Materia Med. p. 519.
(Ab anemone nemorosâ.)

Angustia pectoris.

HELLWING, Flora Campana, Lips. 1719.

Phthisis.

RHEUM.

Horror sine frigiditate externâ. (Circa semihoram observatum.)

Gravitas totius corporis, quasi e somno altissimo experrecti.

Lassitudo femorum, quasi nimis defatigatorum.

Taciturnitas indolens.

5 Segnities taciturna.

Constrictio pupillarum cum inquietudine quâdam. (Si dosis magna fuerit, ad decimam sextam usque horam durat, tunc dilatibiliores fiunt.)

Cephalalgia strictorio distendens, obnubilans et obtusa supra totum quidem cerebrum, maxime tamen in vertice et temporibus.

Cephalalgia primo pressoria, dein lacerans ad occiput usque.

Cephalalgia pulsatoria.

10 Tormina ante et inter sedes, alvo deposita cessantia.

Nausea vomituritiva.

Anorexia coffeæ nisi saccharo condiatur probe.

Sedes diarrhoicæ excrementicii cum pituitâ.

Sedes pituitæ grisæ.

15 Animus varia efflagitans importuno modo et fletu.

Caloris universalis sensus sine siti. (Secundâ horâ observatum. Calor ex Rheo inter vires secundi ordinis sine dubio referendus.)

Calor et venæ tumidæ manuum et pedum, nec tamen brachiorum aut femorum, facie minime calidâ.

Faciei sudor minus quam tepidus, egelidus, maxime circa nasum et os. (Tertiâ horâ observatum.)

Somnolentia.

20 *Inter somnum inspiratio stertorosa.* (Primâ horâ observatum.)

Somnus inquietus, ejulatorius, capite reclinato.

Inter somnum vesperi delirium, ambulatio in lecto, oculis clausis, taciturna, inter calorem corporis magnum.

Inter somnum manus supra caput protensæ.

Post somnum gravitas totius corporis.

25 Post somnum palpebræ materiâ purulentâ conglutinatæ.

Post somnum os internum muco fœtido obductum.

Post somnum sapor putridus in ore.

Post somnum halitus ex ore fœtidus.

Post somnum pressio in scrobiculo, inter inspirandum per sternum propagata, in dolorem quasi a verberatione transiens.

30 Dolor in pollice lancinanti lacerans vehemens. (Tertiâ horâ observatum.)

Lancinatus singuli in pectore. (Sextâ horâ observatum.)

Lancinatus singuli in brachiis.

Dolor simplex omnium articulationum inter movendum. (Inde a duodecimâ per plures horas observavi.)

Narcosis artuum quibus incumbitur.

35 Rigiditas genu inter movendum dolorosi. (Circa vigesimam horam a magnâ dosi observatum.)

Dolor dentium (cariosorum) diruens, elongatio, vacillatio. (A duodecimâ ad vigesimam quartam horam usque observatum.)

Ardor urinæ. (Circa vigesimam horam a magnâ dosi observatum.)

Anorexia.

Plenitudo ventriculi, quasi a nimiâ satietate. (Ab octavâ ad duodecimam usque horam observabatur, hoc demum interdum sequebatur somnolentia.)

OBSERVATA ALIORUM.

MURRAY, Appar. Med. tom. iv. p. 390—396.

Sudor copiosus. (Colore luteo ex MENZEL et TILLINGIUS, odore rhabarbarino ex MENZEL.)
Purgat et postea alvum adstringit.
Sanguinis cursum accelerat, febris auctior.
Respirandi difficultas et anxietas auctior.
[5] Nausea.
Molestiæ ventris.

FORDYCE et LENTIN.

Somnifera virtus.

BAKER.

Tormina et inflatio abdominis.

BROCKELSBY.

Deliria.
Pectoris compressio.
Virium prostratio.

FALLOPIUS.

Ardor in renibus, vesicæ.

SIM PAULLI.

Vertigo.

DATURA STRAMONIUM L.

(Succus foliorum solis calore inspissatus.)

Vis plerumque 24 horas durat, ad summum 36 horas.†

Frigiditas extremitatum.
Frigiditas totius corporis.
Frigiditas et frigus octo horarum.
Animi abjectio.
5 Lacrymatio involuntaria.
Ebrietas. (Aliquando post octo horas observatum.)
Languor, pedes fessi.
Propensio in decubitum pertinax.
Evacuationes suppressæ omnes.
10 Siccitas faucium.
Indeglutitio.
Constrictio gulæ.
Difficultas deglutiendi cum dolore punctorio in gulâ.
Difficultas deglutiendi cum dolore (pressorio) in glandulis submaxillaribus.
15 Sensus in abdomine quasi ab expansione summâ.
Intumescentia abdominis non dura.
Appetitus prostratus.
Nausea.
Vomitus biliosus post levem motum, vel in lecto trunci erectionem.
20 Ptyalismus.
Narcosis artuum.
Catalepsis volatica.

† Experimenta recentia ostendunt vires Stramonii ad horas duodequinquaginta, immo ad plures dies conservari posse.—*Ed.*

(Pressio in scrobiculo).

Dolor lacerans in abdomine, quasi umbilicum evulsurus sit, deinde in pectus tendens.

25 Dolores strictorio lacerantes in dorso et epigastrio. (Exactâ unâ horâ observatum.)

Dolor strictorius in spinæ dorsalis medio, cum dolore strictorio in posteriori parte ventriculi, illi respondente.

Dolor strictorius in spinæ dorsalis medio.

Respiratio gravis.

Respiratio angusta.

30 Sensus circumvolutionis in pectore et tum calor in facie.

Post decubitum noctu dolor discindens in sterno, flatuum secessu evanescens, sed repetens.

Dolor pectoris, sterni pressorius, loquendo excitatus.

Bubo.

Rubor faciei.

35 Caloris sensus in facie post frigus et frigiditatem.

Dolor capitis constrictorius.

Amentia loquax, conquestio de cane pectus mordicus dilacerantibus.

Tumor unius, plurium membrorum.

Dentium dolor pulsatorius, quasi pars dentium casura esset.

40 *Dolores in osse sacro strictorii.*

Dolores in femoribus strictorii.

Incalescentia.

Miliaris rubra eruptio cutis.

Calor, sudor universalis maximus, sine siti. (Quintâ horâ observatum.)

45 Inter calorem obvolvi stragulis apprime gestit, et si vel digitum e lecto emittit, dolorum reditu feroci excruciatur.

Somnus turbulentus.

Insomnia historica.

Convulsiones artuum. (An ad vires secundi ordinis referendum?)

Dolor in dorso parvi spatii (lancinanti?) *strictorius, vel tactu dolorosi.*

50 Dolor dorsi et unâ abdominis quasi a contusione, motu excitandus. (Duodecimâ horâ observatum.)

Dolores dorsi, humeri, quasi a verberatione. (Duodecimâ horâ observatum.)

Macula in dorso dolorifica per se et tactu.

Appetitus auctus.

Sensus oris interni, quasi ab excoriatione. (Circa vigesimam quartam horam observatum.)

55 Memoria imminuta.

(Sequentia non nisi inter reliquias observavi, quarum quæ ad vires primi, quæ ad secundi ordinis vires pertineant, nondum mihi liquet.)*

*Hæmorrhois plures dies fluens.

*Sanguis grumosus ex ano secedens.

*Menstrua aucta, sanguine menstruali frustis magnis, grumosis secedens.

*Menstrua nimia, hæmorrhagia uteri, cum doloribus strictoriis in abdomine, femoribus et artubus.

OBSERVATA ALIORUM.

D. Crugre, Misc. Nat. C. Dec. III. Ann. 2, obs. 68. (A semine in adulto.)

Fauces constrictæ.

Vertigo, ut quasi temulentus hinc inde vacillaret.

Mentis vacillatio.

Variæ phantasiæ obversantes.

[5] Ecstasis.

J. C. Grimm, Eph. Nat. C. Cent. 9, obs. 94. (A semine in puero 8 annorum.)

Insania. (Post 3 horas.)

Saltatio.
Gesticulatio.
Cachinnus.
[10] Cantus.
Sudor largior.
Somnus longus. (Viginti quatuor horarum.)

KELLNER, Bresl. Samml. 1727.
(A seminis decocto.)

Abolitio sensuum, visus, auditus.
Tremores.
Agitationes artuum.
Stridor dentium.
[5] Facies inflata, sanguine turgida.
Oculorum contorsio.
Pulsus tremulus, debilis, inæqualis, interdum intermittens.
Murmura ventris. (Mors post sedecim horas.)
Mentis absentia. (Per viginti quatuor horas)
[10] Delirium leve.

ABR. SWAINE, Neue Edinb. Vers. II. s. 279.
(A decocto pericarpiorum trium.)

Vertigo.
Aëris liberi appetentia.
Tremula vacillatio, ebrii instar.
Timor ne cadat.
[5] Timor ne mente privetur.
Decubitus.
Siccitatis ingentis in linguâ et faucibus sensus.
Siccitatis sensus in pectore.
Pectoris constrictio horizontalis summa.
[10] Balbuties. (Post semi-horam.)
Insensibilitas.
Inquietudo.

Mussitatio.
Frigiditas maxima universalis, artuum, trunci.
[15] Pulsus exilis, celer.
Geniculatio, in genua erectio.
Brachiorum protensio.
Manus quæritantes.
Oculi rigidi, soporosi.
[20] Aphonia. (Post aliquot tempus.)
Torpor, pulsu fere deleto.
Artus paralytici.
Stupiditas. (Per sex vel septem horas.)
Furor immanis, vix contineri patiens, insurgens, feriens, arripere obvios gestiens.
[25] Garrulitas delirans, inconcinna blateratio.
Vicissitudines sanæ mentis et insaniæ.*
Excretionum lotii et alvi suppressio.*
Agrypnia.*

*(Per quatuordecim ipsas horas, quas veneficium duraverat.)

KAAW BOERHAVE, Impet. Fac. Hippocr. L. B. 1745, p. 282.

Ebrietas.
Pupillarum dilatatio.
Oculi splendentes.
Rubor faciei.
[5] Cantus.
Lascivia, impudicitia.
Balbuties.
Oculi horridi, fixi, immobiles.
Tremor labiorum, manuum, pedum.
[10] Stridor dentium.
Convulsiones.
Dementia.

Decubitus in dorso, oculis late apertis, fixis. (Post horam.)

Trismus, labiis occlusis.

[15] Manus, nec tamen pollices, in pugnum contractæ, extensiles tamen.

Contractiones et extensiones artuum lentæ, iterantes.

Inspiratio lenta, exspiratio celerrima.

Pulsus celer, intermittens.

Sensuum et motuum voluntariorum abolitio (catalepsis) deglutitione tamen illæsâ.

[20] Vomitus artificialis inter artuum spasmos.

Somnus altus stertorosus, cum contractione cruris rarâ.

VICAT, Plant. Venen. de la Suisse, p. 248.

(A fructibus.)

Tristitia.

Aphonia.

Pulsus deletus.

Artus paralytici.

[5] Furor.

Vertigines.

Insensibilitas.

Delira blateratio.

Pulsus parvus, celer, tandem vix perceptibilis.

[10] Crura paralytica.

Furor.

Exanthema pruriens.

Pupillæ dilatatio.

J. F. LOBSTEIN, Obs. de Stram. Sem. Virt. Ven. in App. Diss. GUERIN—SPIELMAN, de Pl. Ven. Alsat. Argent. 1766.

(A seminibus in duobus infantibus.)

Artuum lassitudo. (Post quatuor horas.)

Nisus in decubitum.

Calor magnus cum blateratione in somno.

Tumor faciei, genis et labiis prærubris. (Post quatuordecim horas.)

[5] Oculi tumore clausi, pupillis summe dilatatis, bulbis motitatis quaqua versum.

Abdomen tumidum, nec tamen durum.

Contractiones manuum et pedum alternantes.

Convulsiones et deliria tactu maxime excitanda, debilitate mox subsequâ.

Lingua tumida, ex ore protensa.

[10] Fauces præstrictæ, quasi a suffocatione vel apoplexiâ nascitura.

Somnus tranquillus inter convulsionum mitigationem.

Calor magnus, sudore miti, pulsu celeri, molli.

Horror liquorum aquosorum, hydrophobiæ instar, in furorem summum transiens, dum labia iis madefiebant.

Pulsus magis lentus (post octodecim horas), respiratione liberiore, tumore evanido, convulsionibus et deliriis restantibus. (Pupillæ dilatatæ et immobiles cum delirio ad triginta usque horas durabant.)

Comment. de Reb. in Sc. Nat. et Med. Gest. vol. ii. p. 241.

Sitis molestissima cum ptyalismo.

GREDING, in LUDWIGII Adversar. Med. Pr. vol. i. p. 259.

Caput cum dolore obnubilatum.

(Quæ sequuntur symptomata variis temporibus et diversis in hominibus subinde a Gredingio observata.)

Visus varie vitiatus.

Visus hebes.

Anxietas.
[5] Alvus segnior, obstructa.
Alvus laxa.
Appetitus auctus.
Somnus turbulentus.
Somnus tranquillus.
[10] Sudor sæpe profusus.
Febris.
Largum lotii profluvium.
Lippitudo.
Convulsiones oculorum.
[15] Sitis intensa.
Ptyalismus.
Tormina.
Singultus.
Dolores rheumatici.
[20] Pruritus totius corporis.
Formicatio.
Purpura.

GARDANE, Gazette de Santé, 1773, 1774, p. 143.

Incalescentia corporis magna.

KRAMER, Commerc. Lit. Nor. 1733, p. 251.

(A tincturâ spirituosâ seminum.)

Delirium ferox.

DODERLIN, Comm. Lit. Nor. 1744, p. 15.

(A foliorum decocto.)

Mordicans in ventriculo sensus.
Cephalæa.
Rubor faciei.
Narcosis.
[5] Convulsiones.

FOWLER, Medical and Philos. Comment. vol. v. p. 161.
(A sesquidrachmâ seminum in puellâ sexenni.)

Stupiditas.
Tumor ventris.
Tumor faciei, oculorum, linguæ.
Insania.
[5] Cephalæa.

Ibid. (A semi-drachmâ in puellâ trienni.)

Cephalalgia.
Singultus.
Tumor faciei.
Vomituritio.

VAN EEMS, in H. BOERHAAVE, Præl. de Morb. Nerv. t. i. p. 237.
(A pulvere naribus attracto.)

In mento horror.

BUCHNER, Bresl. Samml. 1727.
(A seminibus in adultâ.)

Convulsiones.
Apoplexia.

SCHROER, in HUFEL. Journ. d. pr. Arz. vol. x. p. i. p. 195. (A seminibus.)

Mania ferox, incoercibilis.
Manibus captat.
Ridet.
Volutatio reptans in lecto.
[5] Pedibus insistere nequit.
Pupilla dilatata immobilis.
Congestio sanguinis ad caput. (Symptomata viginti quatuor horas durarunt.)

CHPH. a COSTA, ap. SCHENCK, lib. vii. obs. 139.

Mentis alienatio.

Risus.

Ejulatio.

Somnus.

[5] Alteri, quem non agnovit, colloquitur et respondet, colloquii tamen immemor, postquam ad se rediit.

STOERCK, Lib. de Stram. Acon. Hyosc. Vien. 1762, p. 5. (A vapore.)

Dolor capitis obtusus.

VALERIANA OFFICINALIS L.

(Tinctura radicis.)

Vis.†

Frigiditas.

Vomituriens nausea, quasi a filo pendens, ab umbilico oriens et sensim ad fauces adscendens, affluxum salivæ copiosum ciens.

Odontalgia.

Dolores vagi punctorii in dentibus, collo externo, supra orbitas, in scrobiculo, in umbilico.

5 Scintillæ in visu.

Palpitatio.

Vomituritio.

Vomitus.

Purgatio.

10 Synochus.

Dolor pressorius in abdomine.

Dolor forficans in abdomine.

In abdomine sensus expansionis summus, quasi ad diruptionem usque.

Abdomen durum. (Quartâ horâ observatum.)

15 Torpor paralyticus in artubus.

Dolor quasi a contusione in artubus.

Cephalalgia lancinans.

Cephalæa octo horarum pressorio lancinans.

Dolores rheumatici in scapulis.

20 Dolores rheumatici in artubus.

Dolor strictorius in dorso.

Dolor vulsorius in pectore.

† Hoc medicamentum per quatuor vel quinque dies vires retinet.—*Ed.*

Calor auctus.
Agrypnia.
25 Jactatio.

OBSERVATA ALIORUM.

HILL, on Valerian.

Temulentia, ab odore.

TISSOT, Traité de l'Epilepsie, s. 309.

Anxietas.

RAY, Hist. Pl. tom. i. s. 388; DODONÆUS, Pemp. s. 262.

Vomitus.
Alvi profluvium.

ANDREE, Cas. of Epilepsy, s. 262.

Labefactatio ventriculi.

C. HOFFMANN, Off. s. 583; CARMINATI, Opusc. Therap. vol. i. s. 227.

Diuresis.

CARMINATI, ibid. s. 238.

Pulsus arteriarum auctus.
Calor auctus.

MARCHANT, Mem. de l'Ac. d. Sc. de Paris, 1706.

Sudor copiosus.

VERATRUM ALBUM L.

(Tinctura radicis.)

Vis nychthemerum fere durat.†

Tussicula sicca ob titillationem in imâ sterni parte. (Post pauca minuta observatum.)

Frigiditas totius corporis. (Post primam horam observatum.)

Frigiditas pedum, quasi ab aquâ frigidâ in iis circulante, cum tremore.

Frigoris sensus in vertice capitis et simul in pedibus.

5 Vertigo.

Pupillæ ad summam coarctationem pronæ.

Nisus in decubitum.

Imbecillitas maxima.

Gressus vacillans.

10 Viribus cassus collabitur.

Virium lapsus.

Animi deliquium.

Facies hippocratica.

Languor quasi nimio calore confecti.

15 Aër molestus, ut ex morbo gravi convalescenti atmosphera molesta est.

Ratio deficit.

Delirium mite, frigido corpore, oculis apertis, vultu sereno, interdum risorio, de rebus religiosis, de votis solvendis, de precibus, cum erroneâ de domicilio opinione (alio esse credit). (Post primam horam observatum.)

† Veratrum Album ultra quinque dies durat.—*Ed.*

Rationis status quasi per insomnia.

Taciturnitas.

20 *Aphonia.*

Memoriæ lapsus.

Spuma ante os.

Oculi revulsi.

Coma vigilans, oculis hoc aperto, illo clauso, semi-clauso, cum succussionibus quasi a terrore. (Post semi-horam observatum.)

25 Somnolentia cum terrificis succussionibus somnum impedientibus, postea febriles motus.

Sudor frigidus.

Sudor frigidus frontis.

Strangulationis, suffocationis .accessus, oculis prominentibus. (Post semi-horam observatum.)

Respiratio intercepta.

30 Respiratio fere deleta.

Spasticæ constrictiones gulæ, pupillâ contractiore.

Trismus.

Constrictiones gulæ quasi a pyri austeri esu.

Spasmodica contractio musculorum intercostalium in sinistrum latus, cum respiratione interceptâ. (Tertiâ horâ observatum.)

35 Constrictio pectoris dolorifica.

Anxietas summa, respirationem intercipiens.

Anxietas in deponendo alvo, quæ metum apoplexiæ incutit.

Ante alvum deponendam sensus quasi a syncope nascitura in abdomine infimo.

Angor suspiriosus.*

40 Suspiria æstuantia.*

*(Secundâ et tertiâ horâ observatum.)

Spei abjectio, animus desperans.

Angor, quasi ex malâ conscientiâ.

Angor, quasi a divinatione fati impendentis. (Octavâ horâ observatum.)

Tremor totius corporis.

45 Susurrus aurium. (Post duas horas observatum.)

Obturatio auris alterutrius.

Siccitas palpebrarum summa. (Post semi-horam observatum.)

Palpebræ siccæ, maxime post somnum, dolentes quasi ab attritu, rigidæ, conglutinatæ.

Palpebræ conglutinatæ in somno. (Post quartam horam observatum.)

50 Inter somnum brachia pone caput porrecta. (Intra primas horas observatum.)

Palpebrarum siccitatis sensus.

Febriles motus.

Horripilatio cutem perreptans, v. c. faciei. (Circa secundam horam observatum.)

Oscitatio.

55 Singultus.

Ardor in gulâ. (Post secundam horam observatum.)

Rasionis sensus in gulâ.

Aspritudo faucium.

Gulæ coarctatio quasi a tumore interno premente, anginæ species.

60 *Gustus imminutus, sapor pultaceus in ore.* (Jam primo quadrante horæ observatum.)

Sapor insulsus, insipidus.

Siccitas faucium, potulentis non sedanda. (Sextâ horâ observatum.)

Appetentia fructuum horæorum, citri acidis.

Appetentia pomorum.

65 Sapor putridus instar fimi.

Fimi fœtoris sensus. (Circa horam decimam sextam observatum.)

Labia fissilia.

Dentium vacillatio.

Siccitatis narium internarum sensus et irritatio ea quæ a pulvere viarum aridarum in naribus oriri solet. (Tertiâ horâ observatum.)

70 Sensus quasi ab ulcere in naribus.

Rheumatica nuchæ rigiditas, vertiginem acciens, maxime inter movendum.

Capitis dolor interrupte pulsatorius. (Sextâ horâ et a majori dosi observatum.)

Capitis dolor pulsatorius supra oculum sinistrum per quadrantem horæ. (Primâ horâ observatum.)

Capitis dolor pressorio pulsatorius.

75 *Capitis dolor obtuse pressorius in vertice* (mane) *post somnum.*

Capitis dolor quasi fractum sit cerebrum aut pars ejus.

Hemicrania pressoria cum ventriculi dolore connexa. (Post quartam horam a minori dosi observatum.)

Congestio ad caput inter pronationem. (Octavâ horâ observatum.)

Dolores ex pressione et contritione compositi hinc inde in cerebro, interrupti. (Post primam et plures horas observatum.)

80 *Stomachus non sine proritatione.* (Quartâ horâ observatum.)

Animus vitia aliorum conquirens.

Convicia irritati, alias taciturnitas.

Ructus inanes.

Ructus amari.

85 *Vomituritio cum sapore bilioso in ore.*

Vomitus primo biliosus, dein pituitæ maxime tenacis.

Ante vomitum semper horror supra totum corpus.

Effluxus salivæ aqueæ copiosus, quasi a verminatione.

Cardialgia.

90 Cardialgia quasi a fame canina.

Pressio in scrobiculo vehemens, ad sternum, hypochon-

dria et ossa ilei propagata. (Octavâ horâ observatum.)

Dolor tensivus in hypochondriis quasi a flatibus.

Dolores circa præcordia pressorii, strictorii.

Dolor in abdomine hinc inde, cultris quasi discindens. (Statim post ingestum Veratrum observatum.)

95 *Colica flatuosa hinc inde intestina lacessans et totum abdomen occupans, flatibus quo serius, eo rarius et difficilius abeuntibus.* (A sextâ inde horâ ad duodecimam usque horam observatum; transitus a primo ad secundum virium ordinem.)

Dolor tractorio lacerans per minuta, in infimo abdomine, maxime supra os pubis. (Primâ horâ observatum.)

Tormina discindentia. (Duodecimâ horâ observatum.)

Secessus flatuum copiosus. (Primis horis.)

Flatuum eruptio tumultuosa deorsum.

100 Sedes citæ, crebræ, molliores. (Primis horis observatum.)

Ardor ani in alvo deponenda. (Duodecimâ horâ observatum.)

Acredo excrementorum. (Duodecimâ horâ observatum.)

Herniam incarcerare tentat.

Inter tussim lancinans dolor ex abdomine per funiculum spermaticum penetrans. (Circa tertiam horam observatum.)

105 Hæmorrhois cœca. (Decimâ horâ observatum.)

Ardor urinæ.

Acredo urinæ.

Sensus strictorius in testiculis.

Intertrigo præputii. (Post 6 horas.)

110 Coryza. (Octavâ horâ observatum.)

Titillatio in infimâ bronchiorum parte tussifera, ex-

pectoratione levi. (Primâ et sextâ horâ observatum.)

Dolor in musculosis corporis partibus expressione et contritione compositus.

Dolor strictorius in artubus.

Dolor omnium membrorum, quasi fatigatione confecta essent.

115 Sensus in ossibus quasi contrita essent. (Secundâ horâ observatum.)

Pressio in sterno. (Secundâ horâ observatum.)

Dolor in pectore sinistro, parvo spatio circumscriptus, punctorio pulsatorius. (Quintâ horâ observatum.)

Dolor in sterno pressorius a cibo, potu.

Sensus in brachio, quasi nimis plenum seu tumidum esset.

120 *Narcosis artuum.*

Formicatio in digitis.

Narcosis digitorum. (Primâ horâ observatum.)

Formicatio in digitis angorem procreans.

Ardenti pruriens dolor in digiti minimi primâ phalange, ut a gelu. (Sextâ horâ observatum.)

125 Quasi a luxatione dolor in pollicis articulo.

Dolor rheumaticus per motum sensibilis intra scapulas et nuchâ ad os sacrum, maxime inter alvum deponendam sensibilis.

Dolor gravativus crurum, quasi a lassitudine.

Fragor genu.

Crampus surarum.

130 Pedes subito tumidi, post aliquot horas detumescentes.

Post sessum inter motum dolor paralyticus et quasi a contusione articulationum genu et ossis sacri. (Octavâ horâ observatum; an ad secundum ordinem referendum ?)

In pollice pedis lancinantes dolores. (Quintâ horâ observatum.)

Inter sessum dolor lacerans musculorum extensorum.*

(Dolor lacerans in auriculis).*

135 (Oculi inflammatio, cum dolore lacerante).*

Oculi albugineæ inflammatio, cum dolore lacerante in eo. *(Hæc an ad secundi ordinis vires sint referenda, non liquet.)

(Quæ sequuntur ad vires secundi ordinis videntur referenda.)

Pupillæ dilatatæ.

(Somnus nimis altus).

Pruritus cutis exedens. (Duodecimâ horâ observatum.)

140 Eruptiones cutaneæ, scabiei species.

Pustulæ acervatim conglomeratæ, dolorificæ.

Miliare exanthema per calorem etiam interdiu pruriens (solum in juncturarum regione?) post fricatum urens, inter eruptionem tuberculorum urticalium.

Constipatio ob crassitiem et duritiem excrementorum alvinorum. (Tertiâ et decimâ quartâ horâ observatum.)

Excretiones omnes suppressæ. (A nimis magnâ dosi per aliquot dies observatum.)

145 Intestina labefacta quasi et contrita, flatibus abire recusantibus.

Flatus, meteorismus surde torminosus, inquietudo et tensio abdominis quasi ab alvo constipata.

Dolor in hypochondriis et pectore a flatibus abire recusantibus.

Titillatio in imâ bronchiorum parte, sine expectoratione. (Post nychthemerum observatum.)

(Quæ sequuntur tanquam reliquias observavi, ex nimiis dosibus.)*

*Agilitas et pathorum et dolorum imminutio.

150 *Inquietudo negotiosa.

Laboris amor.

Hyperæsthesiâ, mentis status exaltatus.

Animi effusio. (Interdum matutinam observavi, interdum vespertinam.)

Febricula (statim) plurium dierum, interdum chronica.

155 Chronica debilitas.

Sopor, coma vigilans.

Metus.

Idearum penuria.

Motus corporis tardus.

160 Succussiones quasi electricæ, cum dolore subsequo genu et cubiti quasi a contusione.

Podagram restituit.

OBSERVATA ALIORUM.

BENIVENIUS, apud SCHENCK, lib. vii. obs. 174.

Crebra et vehemens alvi dejectio. (Hæc transitum in secundum virium ordinem parare videntur.)

Spiritus attractio summe gravis ac difficilis ad mortem usque, post sex horas insequentem.

Idem, apud eundem, obs. 175.

Vomitus primo bilis ac pituitæ, tum nigræ bilis, postremo sanguinis.

Imbecillitas maxima.

[5] Sudor frigidus in toto capite et thorace emanans.

FORESTUS, apud SCHENCK, ib. obs. 176.

Convulsio.

(In alio ab infuso vinoso.)

Vomitus enormis.

Cholera.

Animi defectus.

Anhelitus præfocatio.

L. SCHOLZIUS apud SCHENCK, ibid. obs. 187.

(A pulvere, condimenti loco.)

Quasi strangulati hospites in suffocationis periculo versabantur.

S. LEDELIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. i. obs. 95.

Vomitus. (Statim.)

Alvi fluor copiosissimus dolorosus.

Vertigo post semihoram.

Dolor capitis.

[5] Convulsiones.

(A granis decem.)

Tensio artuum.

Circumgyratio capitis, cum gravitate.

R. LENTILIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. III. Ann. i. App. s. 130.

Vomitus horrendi.

Alvi excretiones.

Convulsiones epilepticæ.

Tanta tormenta (dolores, anxietas), ut sanguis per unguium rimas transudaret.

S. GRASSIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. iv. s. 93.

Balbuties.

Delirium leve.

Æstus internus cum potus denegatione.

J. de MURALTO, Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. ii. s. 240.

(A fœminâ 30 annorum ab infuso vinoso.)

Singultus. (Post quadrantem horæ.)

Strangulatio circa gulam.
Anxietas.
Incendium circa præcordia.
Sternutationes fortes, frequentissimæ.
Vomitus.
Spasmus.
Convulsiones. (Mors post duodecim horas.)

RIEMAN, Bresl. Samml. 1728. s. 535.
(A semidrachmâ.)

Anxietas.
Cardialgia.
Strangulatio, constrictiones spasticæ gulæ.
Vertigo summa.
Cholera.
Inflatio œsophagi.
Inflatio abdominis.
Crampus surarum.

DOBOLENSKY, Misc. Nat. Cur. Dec. I. Ann. ii.

Apoplexia.

BORRICHIUS, Acta Hæn. tom. vi. s. 145.

Oculorum intorsiones.
Visus abolitus.

P. J. REBGIUS, Mat. Med. s. 872.

Ardor faucium.
Sensatio corrodens cardialgica.
Oppressio pectoris.
Lancinantes imi ventris dolores.
Lancinantes vagi dolores.
Piperis sensus in faucibus.

Conr. Gesner, Epist. Med. f. 69.

(Ab infuso aliquot granorum.)

Ardor circa scapulas.
Ardor in facie, capiteque.
Fervor linguæ et gutturis.
Inflatio œsophagi, cum suffocationis sensu.
[5] Singultus per semi-horam.
Hilaritas.
Acies ingenii.

Ettmuller, Op. tom. ii. p. ii. s. 435.

Vomitus violentissimi.
Dejectiones alvinæ, violentæ, sanguineæ.

Smetius, Misc. Med. s. 565.

Epidermidis desquamatio.

Loras, de Melanchol. ii. s. 312—315.

Syncopes metus.
Faucium strangulatio.
Stomachi et intestinorum cruciatus.
Anxietates.
Vomitus enormis.
Crampus surarum.
Convulsiones.

J. E. Greding,† Vermischte Schr. s. 30.

Vomitus viridis muci, bilis viridis.
Phlogosis in facie, naso, oculo, ore, linguæ.
Eruptiones cutaneæ.
Maculæ cutaneæ.
Pleuritica symptomata.
Calor corporis cum rubore et calore faciei.
Sitis dira.

† Tumultuarius observator; enormes doses urgens.

Cephalalgia dira.
Formicationes in digitis, manibus.
Insudatio.
Enuresis.
Salivatio.
Salivæ profluvium multum.
Menstruatio in amenorrhœa.

SMITH, Med. Communic. vol. i. s. 207.
Vertigo.
Singultus.
Nausea.
Vomitio.
Debilitas summa.

KLAM, N. Amer. Resa, tom. iii. s. 49.
Ardoris sensus.
Enuresis.

VICAT, Plant. Venen. d. la Suisse, s. 168.
(Loco condimenti in escis.)
Frigiditas universalis.
Gelidus sudor totius corporis.
Imbecillitas extrema.
Sensus fere evanidi.
Pulsus fere evanidus.
Vomitus ferox.
Crura trementia.

WINTER, Bresl. Samml. 1724, s. 268.
Constrictio gulæ.
Convulsiones artuum.

DESSENIUS, Comps. Med. lib. x. 422.
Diarrhœa sanguinea.

RODDER, in ALBERTI, Med. Leg. obs 15.
Frigus universale.
Anxietates.
Hypercatharsis.
Vox deficiens.
Sudor frigidus.
Pulsus imperceptibilis.
Convulsiones.

ASTON, Lect. on Mat. Med.
(Ab infuso semidrachmæ.
Vomitus niger.

INDEX.

LONDON:
C. ROWORTH AND SONS, BELL YARD,
TEMPLE BAR.